

علم تصنيف النباتات Plant Taxonomy

المقدمة:

عندما قام أنسان ما في اعماق التاريخ بالتقاط نبات ما وشخصه بأنه صالح للأكل ولد علم عرف فيما بعد بعلم التصنيف. سرعان ما أستطاع الانسان أن يميز أي الأنواع النباتية صالحة للأكل وأيها يستخدم للوقود وترك السامة منها. وهذا التصنيف سمي فيما بعد بالتصنيف الشعبي Folk Taxonomy وهذا النوع من التصنيف يعتمد عادة على مظهر النباتات أو صفات أخرى مثل الرائحة ، المذاق أو القيمة الغذائية ان هذا التصنيف لا يستند إلى أي أساس علمي لأنه نشأ في المجتمعات البدائية من خلال الحاجة إليه، كما أن التسميات التي أعطيت للنباتات دُعيت بالأسماء العامة أو الدارجة common names ولذلك نجد أن الإنسان في بداية حياته قد تعامل مع عدد محدود من النباتات وبقيت معظم خصائص النباتات مجهولة. ومما لا شك فيه أن التعرف على خصائص النباتات مهم بالنسبة للباحثين والمختصين، حيث أنه لا يمكن دراسة أي نبات أو أي كائن حي آخر دون التعرف على الاسم العلمي الخاص به، إذ أن الاسم الشائع لا يعول عليه في الدراسات أو البحوث.

أن العدد الكبير من النباتات المحيطة بنا يستوجب أن يكون هناك نظام أو طريقة يتم فيها ترتيب هذه النباتات بغية تسهيل دراستها والتعرف عليها، حيث أنها تصبح عديمة الأهمية من الناحية العلمية ما لم تعطى لها أسماء علمية خاصة تميزها عن بعضها البعض وتترتب في نظام معين يسهل معرفة هذه الأسماء.

أن العلم الذي يستهدف تشخيص الكائنات الحية بصورة عامة وتصنيفها يدعى بعلم التصنيف Taxonomy وما يتعلق بالنباتات يدعى plant taxonomy. ان أول من أطلق هذا الاصطلاح هو العالم السويسري De-Candole (1841-1779) يمكن تعريف علم التصنيف taxonomy وبمفهوم محدود على أنه العلم الذي يهتم بدراسة الكائنات الحية وتقسيمها إلى مجاميع بهدف تسهيل التعرف عليها. أي أنه يهتم بدراسة Classification: ويعرف الأخير بأنه تقسيم الأحياء إلى مجاميع لتسهيل دراستها.

هناك مصطلح آخر مرادف للاصطلاح taxonomy وهو systematic ويعرف بأنه دراسة ووصف التغيرات في الكائنات الحية والبحث عن الاسباب التيادت الى هذه التغيرات ومن ثم معالجة البيانات المحصل عليها للوصول إلى نظام تصنيفي، أن هذا التعريف أوسع واشمل من التعريف الأول.

يعد التصنيف من العلوم الأساسية القديمة، وهو حقل علمي واسع يستخدم البيانات من العلوم البيولوجية الأخرى للوصول إلى أهدافه مثل علم التشريح Anatomy، علم الفسلجة Physiology، علم الخلية Cytology، علم الوراثة Genetics، علم البيئة Ecology، علم التطور Evolution، علم الاجنة Embryology وعلم الكيمياء الحياتية Biochemistry.

أن علم التصنيف الذي يعتمد بصورة رئيسية على دراسة الصفات المظهرية والتشريحية (أي على المعشبة) يسمى علم التصنيف التقليدي (الكلاسيكي) classical or orthodox taxonomy (أما علم التصنيف الحديث أو التجريبي Experimental taxonomy فيعتمد على الدراسات الحقلية ويدعى أيضاً التصنيف الحيوي (الحياتي) Biosystematics ويهدف هذا العلم إلى جمع أكبر قدر من المعلومات ومن كل الجوانب التصنيفية المتوفرة (المظهرية، التشريحية، البيئية، الخلوية، حبوب اللقاح وغيرها) وصياغتها في قالب يعكس العلاقات التطورية Evolutionary relation ships بين المراتب التصنيفية ومثل هذه العلاقات التطورية يطلق عليها phylogenetic system of classification وفي الآونة الأخيرة أخذ علم التصنيف منحى أكثر شمولية ودقة خاصة بعد التطور الذي حدث في حقل المجاهر الالكترونية (الماسح Scanning E.M والنفاذ Transmission E. M واعتمدت أيضاً تقنيات حديثة في مجال التصنيف منها (علم الامصال) Serology و DNA sequencing وتقنية PCR (Polymerase chain Reaction) وغيرها.

أهداف علم التصنيف:-

يهدف علم التصنيف

1- التشخيص Identification

ويعني التعريف بهوية أي نبات من النباتات وذلك بإرجاعه إلى المجموعة التي ينتمي إليها، أي تحديد موقع النباتات من حيث عودته إلى وحدة تصنيفية. (Taxon (Taxa)
* الوحدة التصنيفية (Taxon) تعني إما نوع species أو جنس genus رتبة, order عائلة family.... وهكذا، وللتشخيص طرق ووسائل مختلفة هي :

أولاً: المقارنة

وهي طريقة مقارنة العينة المجهولة بعينات مشخصة أما من المعشب (عينات معشبية) أو المقارنة مع صور أو رسوم تخطيطية، وقد تتطلب هذه الطريقة معرفة أسم الجنس أو العائلة على الأقل. مصادر المقارنة للنباتات:

1-المعشب Herbarium الجمع (Herbaria) :

وهي مجموعة من العينات المجففة والمثبتة على ورق خاص، وتتضمن مجموعة من المعلومات تخص العينة متمثلة بـ (أسم الجامع ومكان وتاريخ الجمع) مثبتة على ورقة صغيرة label بجانب العينة وتحفظ هذه العينات في خزانات خاصة.

2- المكتبة Library

توفر المكتبة المراجع العلمية التالية:

أ- الموسوعات النباتية. Floras

وتتضمن الفلورات (الموسوعات) دراسة ووصف لنباتات منطقة معينة مثل الموسوعة الأوروبية، الموسوعة العراقية، الموسوعة التركية وهكذا ويشمل الوصف صفات تصنيفية Taxonomic characters وهناك صفات خاصة يستند عليها في تشخيص الوحدة التصنيفية عن الوحدات التصنيفية التي لها علاقة بها وتدعى مثل هذه الصفات بالصفات المميزة diagnostic characters

ب- الفهارس: Indexes:

وهي سلسلة من المجلدات تنشر كل خمس سنوات تتضمن أسماء جميع العوائل والأجناس والأنواع وأسماءها المرادفة مع أسم المؤلف وتاريخ النشر. مثال فهرس كيو. Index kewensis

ج - المونوغرافات. Monographs :

وهي دراسات خاصة لفئة معينة (Taxon) مثلاً جنس أو عائلة ومن جميع النواحي وفي كل العالم.

د - القواميس النباتية:

وتتضمن أسماء علمية أو مصطلحات نباتية، أسماء عامة أو اشتقاقات الأسماء مثل Botanical Latin.

هـ - الدوريات أو المجلات العلمية. Periodicals

وهي مجلات متخصصة بتصنيف النباتات، وتصدر على فترات مختلفة (شهرية، نصف سنوية أو سنوية). ومن أمثلتها مجلة Brittonia, مجلة Taxon, American journal of Botany. الحديقة النباتية أو حديقة التجارب (Botanical (Experimental Garden). وتعد مكان لأجراء التجارب العملية و البحوث التصنيفية، كما أنها مصدر لتجهيز المعشبة بالعينات الضرورية والنادرة .

ثانياً: استخدام المفاتيح التصنيفية. keys

يشترط في هذه الطريقة معرفة المصطلحات التصنيفية وأن تكون العينة النباتية كاملة. وهناك أنواع مختلفة من المفاتيح منها الرقمي أو المتوازي Bracketed والمفتاح المدرج Indented.

ثالثاً: الاتصال الشخصي Personal communication :

في هذه الحالة يتم الاتصال بمتخصصين أو خبراء بوحدة تصنيفية معينة (عائلة أو جنس) ويكون ذو إمام بتلك الوحدة التصنيفية .

2- التسمية Nomenclature

وتعني إعطاء أسم علمي جديد وفق القواعد الدولية للتسمية النباتية
ICBN international code of botanical nomenclature (ICBN) وفيها يتم تعريف الفئة
التصنيفية Taxon والمراتب التصنيفية وهي كالآتي:

المملكة Kingdom

القسم Division

الصف Class

الرتبة Order

العائلة Family

العشيرة Tribe

الجنس Genus

القطاع Section

السلسلة Series

النوع Species

الصف (الضرب) Variety او السلالة Forma (ويمكن أن تقسم هذه المراتب إلى تحت sub مثلاً
subfamily, subgenus, subspecies....

قواعد التسمية العلمية Scientific Nomenclature :

- لكل نوع (فما دون) أسم علمي صحيح واحد فقط وهو إسم ثنائي
- يتألف الاسم الثنائي من إسمين هما (إسم الجنس و النوع) ويكون الحرف الأول من أسم الجنس كبير ومن النوع صغير وكذلك المراتب الأولى.
- يكتب الاسم العلمي باللاتينية أو بالحروف المائلة (وأحياناً بدل ذلك بوضع خط تحت الاسم العلمي).
- يتبع الاسم العلمي بمختصر إسم المؤلف.

3- اشتقاق الاسم العلمي.


يتكون الاسم العلمي من (اسم جنس و نوع) كما أسلفنا، أسم الجنس يكون مفرد عادةً ويبدأ بحرف كبير وقد يتكون من نوع واحد أو عدة أنواع ويشق من أي مصدر مثلاً من أسم عالم تخليداً لذكره أو أسم شائع مثل السكر بالعربية كما في الجنس Saccharum أو من صفة معينة مثلاً من صفة ثلاثية

الوربيقات الجنس Trifolium ، أما النوع فيشتق من مصادر عديدة وأغلبها شيو عاً صفات معينة ومنها:

الخردل الأبيض صفه من اللون الأبيض	<u>Brassica alba</u>
الفاصوليا الشائعة من الشائع	<u>Phaseolus vulgaris</u>
النعناع المائي من صفه الطبيعة المائية	<u>Mentha aquatica</u>
القهوة العربية صفه من القومية العربية	<u>Coffea arabica</u>
القو غ (الغرب) ألفتاتي نسبة إلى نهر الفرات	<u>Populus euphratieus</u>
السالفيا المصرية نسبة إلى مصر	<u>Salvia aegyptiaca</u>

3- التصنيف Classification

ويعني وضع النباتات في مجاميع (class, order, family, genera ...etc) استناداً إلى علاقات القرابة فيما بينهما، حيث توضع النباتات التي تشترك فيما بينهما بعدد من الصفات الأساسية في مجموعة واحدة تمثل نوعاً واحداً Species وتوضع الأنواع المتقاربة في مجموعة أكبر تعرف بالجنس Genus ومجموعة الأجناس المتقاربة توضع في عائلة واحدة Family ... وهكذا صعوداً إلى المراتب التصنيفية الأعلى.



علاقة علم التصنيف بالعلوم الأخرى:

1- علم الشكل الظاهري Morphology :

تستخدم الصفات المظهرية كأساس لتصنيف النباتات وذلك لكثرة الصفات المظهرية وتعددتها، كما أنها لا تحتاج إلى جهد كبير لملاحظتها. وقد تكون واضحة جداً بحيث يمكن بسهولة التشخيص استناداً إليها. إلا أن الاعتماد على هذه الصفات لوحدها غير كافٍ لتوضيح العلاقات التطورية بين المجاميع، فمن الصعوبة تحديد أي الصفات تكون بدائية.

2- علم التشريح Anatomy:

ساعدت الصفات التشريحية على حل الكثير من المشاكل في الدراسات التصنيفية، واستناداً لهذه المعلومات قسمت المملكة النباتية إلى نباتات وعائية ولا وعائية. وكذلك عرفت الفروقات بين ذوات الفلقة والفلقتين ومعرفة ومغطاة البذور، كما وصحح الوضع التصنيفي لبعض النباتات مثل نبات عدس الماء Lemna حيث كان يعد من النباتات البدائية، غير أنه أصبح من النباتات المتطورة استناداً إلى الصفات التشريحية. إن الخشب من أهم الصفات التشريحية التي درست في النباتات وقد أمكن من خلال دراسته الوصول إلى الحقائق التالية.

- 1- خشب معرفة البذور أقل تطور خشب من مغطاة البذور.
- 2- الأوعية الطويلة الضيقة أقل تطور من الأوعية القصيرة العريضة.
- 3- الأوعية ذات المقطع المضلع أقل تطور من الأوعية ذات المقطع الدائري.
- 4- الأوعية ذات التنقر السلمي أقل تطور من ذات التنقر المتقابل والأخيرة أقل تطور من ذات التنقر المتبادل.

3- علم الخلية Cytology :

من العلوم المهمة بالنسبة لعلم التصنيف .ان المعلومات التي يقدمها هذا العلم تتمثل بالعدد الكروموسومي chromosomes number أشكال الكروموسومات chromosomes morphology سلوك الكروموسومات chromosomes behaviour أثناء الانقسامين الاعتيادي Mitosis والأختزالي Meiosis. يدعى علم التصنيف الذي يعتمد على الدراسة الخلوية وخاصة تركيب الكروموسومات بالتصنيف الخلوي .Cytotaxonomy.

4- علم المتحجرات النباتية Paleobotany:

يعد من العلوم الاساسيه في تحديد أوجه القرابة بين النباتات من خلال دراسة السجلات القديمة (المتحجرات) وأيضاً تحديد أعمار النباتات المتحجرة ونشوء الأحياء، حيث أن الأحياء إما أن تنشأ من أصل واحد أو منشأ واحد ويقال لها Monophyletic أو من أصول متعددة ويقال لها Polyphyletic .

5- علم البيئة النباتية Plant Ecology :

يدرس علم البيئة العلاقة بين النباتات وتأثير المحيط عليها، وتبرز أهميته في النقاط التالية:
أ- فهم انتشار وتوزيع الأنواع في المجتمعات النباتية (الفلورا).
ب- فهم العلاقات الوراثية والتطورية بين المراتب التصنيفية.
ج- فهم التغيرات التي تحدث ضمن المجتمعات النباتية والتكيفات التي تصاحبها نتيجة التباين في عوامل الظروف المحيطة.
د- فهم العلاقات بين الكائنات الحية والمتمثلة بالتعايش والتطفل والتنافس وغيرها.

6- الجغرافية النباتية Phytogeography :

وهو العلم الذي يدرس كيفية توزيع النباتات على سطح الأرض وخواص الموطن الذي تتواجد فيه هذه النباتات وأيضاً منطقة نشوءها وكيفية تطورها كما ويدرس أسباب وجود النباتات في منطقة معينة دون غيرها وكم مضى عليها في تلك المنطقة وما سرعة هجرة أفرادها وما هي الاتجاهات التطورية التي ترافق سلوكها هذا.

7- علم الوراثة Genetics:

يدرس هذا العلم ميكانيكية الوراثة على المستوى الجزيئي أو النشوي أو على مستوى السكان، وإمكانية تطبيق هذه المعلومات على المشاكل التطورية أو التصنيفية. ويستفاد من هذا العلم أيضاً في اكتشاف الهجائن الطبيعية والانعزال التكاثري ، ويعد هذا العلم من العلوم المهمة في الوقت الحالي الذي يعتمد عليه في عزل النباتات والعلاقات التطورية، حيث انه يعتمد على الملايين من الصفات التي تحملها النباتات.

8- علم حبوب اللقاح Palynology :

يستخدم هذا العلم في تصنيف النباتات وتفسير المشاكل المتعلقة بالدراسات الجيولوجية والبيئات النباتية القديمة. وقد ساعد التطور في حقل المجاهر على دراسة الصفات الدقيقة لحبوب اللقاح مثل النحوت والزخارف فضلاً عن الصفات الأساسية والمهمة مثل الأحجام والأشكال.

9- علم الكيمياء الحياتية Biochemistry :
تحتوي النباتات على مواد كيميائية مختلفة، ولذلك تم استخدام هذه الصفة في عزل الأنواع إلى مجاميع.
كما ساعد هذا العلم على معرفة العلاقات التطورية الكيميائية بين النباتات، ويسمى العلم الذي يربط بين
التصنيف والكيمياء بالتصنيف الكيميائي. Chemotaxonomy .

10- علم الفسلجة Physiology:
ساعد علم الفسلجة على تفسير المسار التطوري لمختلف المجاميع وعلى مستويات عدة مثل العوائل.
وخاصة فيما يتعلق بعملية التركيب الضوئي حيث تقسم النباتات استناداً إلى ذلك إلى (CAM , C4 , C3) .

اتجاهات حديثة في علم التصنيف:

من الاتجاهات الحديثة في مجال التصنيف الآتي:

1- التصنيف العددي (الحسابي) Numerical Taxonomy :
وهو من العلوم التي أدخلت في الدراسات التصنيفية بعد التطور الذي حصل في مجال الحاسوب إذ
يعتمد على تحويل المعلومات المأخوذة من جوانب تصنيفية أخرى عديدة (مظهرية، تشريحية،
وغيرها) وبطرق إحصائية (حسابية) معينة إلى أرقام وجداول وبالتالي أشكال تعكس العلاقات التطورية بين
الوحدات التصنيفية المدروسة.

2- علم الامصال Serology:
وهو من العلوم الحديثة في تصنيف النباتات وله أهمية في تحديد أوجه القرية بين النباتات ويعتمد على
مقارنة بروتينات النباتات بعضها مع البعض الآخر.

3- التقنيات التي تعتمد على معلومات الأحماض النووية (DNA, RNA):
وهي تقنيات جديدة في مجال تصنيف النباتات ويعتمد عليها في تقسيم العوائل والعشائر ودراسة
علاقات القرية بين الوحدات التصنيفية ومنها.

- (Polymerase chain reaction) PCR
- DNA Sequencing
- (Random amplified polymorphisim DNA) RAPD
- (Restriction fragment length polymorphisms) RFLP

تاريخ علم التصنيف

ظهرت بدايات علم التصنيف منذ أن استخدم الإنسان النباتات لسد احتياجاته دون الاستناد إلى أساس العلمي وهي فترة التصنيف القديم كما ذكرنا سابقاً.

يعد العالم يثوفر استس (Theophrastus (285 - 370 قبل الميلاد وهو عالم يوناني أول من كتب عن تصنيف النباتات وهو أول من وضع أسس علم التصنيف وذلك في كتابه De Historia plantarum وقد ميز بين النباتات الزهرية واللا زهرية كما ميز بين الكثير من النباتات باستخدام صفات مختلفة منها المبيض المرتفع والمبيض المنخفض وكذلك البتلات المنفصلة والبتلات المتحدة وأيضاً أنواع الثمار، وهو أول من قسم النباتات إلى أشجار وشجيرات وأشباه شجيرات وأعشاب وقد تتلمذ على يد أفلاطون وأرسطو و دعي بأبو علم النباتات The Father of Botany وبعد فترة الإغريق قل الاهتمام بالنباتات وبقي الاعتماد على ما كتب عن النباتات في ذلك الوقت. وخلال عصر النهضة بدأ الاهتمام بالأعشاب وظهرت فترة العشابين Herbalists وانتشرت كتب الأعشاب الطبية التي تهتم بالنباتات كأطعمة وأدوية ومنهم (J. Bock (1539. كما برز عدد من العلماء العرب الذين اهتموا بدراسة النباتات وخصائصها وتصنيفها وطرق تكاثرها ومن أشهرهم جابر بن حيان وأبن سينا (وكانت معظم مؤلفاته في تاريخ النبات والنباتات الطبية) وأبن البيطار (والذي وصف حوالي 1400 نبات) وداود الأنطاكي صاحب تذكرة داود. وفي بداية القرن السابع عشر ظهر بعض العلماء وألفوا كتب عديدة اعتبرت خطوة مهمة في تقدم علم التصنيف النباتي ومنهم: (1519 - 1603) Anddrea Caesalpino وهو أول مصنف نباتي First Mont Taxonomist وقد أسند في تصنيفه للنباتات على أساس طبيعة النمو وأشكال الثمار والبذور، وكذلك الأخويين السويسريين (1541 - 1631) Bauhin و (1560 - 1624) G. Bauhin والأخير أول من بين وجود مستويين تصنيفين هما الجنس والنوع. أي نظام التسمية الثنائية. إلا أنه لم يستخدمهما بشكل ثابت كما فعل كارلوس لينوس فيما بعد. أما المصنف الانكليزي (1608 - 1705) John Ray فهو أول من أطلق لفظ ذوات الفلقة الواحدة والفلقتين. وقد أستخدم في نظامه العديد من الصفات الخضرية والتكاثرية وقسم النباتات العشبية الى عديمه الازهار ومن ضمنها الطحالب والفكريات واعشاب زهرية الى ذات الفلقة والفلقتين، كما قسم الاشجار الى ذات فلقة وفلقتين. ويعتبر العالم كارلوس لينوس **Carolus Linnaeus** أشهر من قام بتقسيم النباتات حيث وضع الأساس الصحيح لنظام التسمية الثنائية المعمول به حالياً.

حيث قسم النباتات والحيوانات والمعادن ولقب بأبو علم التصنيف The Father of Taxonomy وأهم انجازاته كتاب النظم الطبيعية System Naturea وكذلك الكتابين المشهورين الأجناس النباتية Genera Plantarum والأنواع النباتية Species Plantarum وتبلغ عدد الأجناس التي عرفها لينوس من النباتات 1105 جنس وتتضمن 7700 نوع. وبأختصار قسم لينوس المملكة النباتية في نظامه الى 24 صفاً على اساس خصائص الاسديه من حيث الطول والعدد وطبيعته الارتكاز والتحامها.

إن أول من أطلق الاصطلاح Taxonomy هو العالم النباتي (1778 - 1841) De – Candole كما قام بتقسيم النباتات إلى مجموعتين كبيرتين هما النباتات الوعائية Vascular plants والنباتات اللا وعائية Non - Vascular plants، أما نباتا وهوكر فقد ألفا كتابهما المشهور Genera Plantarum والذي اقتصر على تصنيف النباتات البذرية.

انتشرت فكره التطور بعد ان درس جارلس دارون Darwin 1859 اصل الانواع يث برزت فكره التصنيف التطوري، لذا اعتبرت دراسه المتحجرات ضروريه لتحديد العلاقات التطوريه بين الانواع. ان سبب حدوث الغايرات بين الاجيال يعود الى :

- 1- التزاوج
- 2- الطفرات الوراثية
- 3- عوالم المحيط.

انظمه التصنيف :

نظراً لاختلاف الأسس التي أعتمد عليها المصنفون والباحثون في تقسيم النباتات وفي أطوار التصنيف المختلفة فقد ظهرت أنظمة مختلفة لتقسيم النباتات different systems of classification وهي:-

1- النظام التصنيفي الميكانيكي أو الاصطناعي

Mechanical or Artificial system of classification

وهو نظام يستند إلى صفة مظهرية واحدة ويترك بقية الصفات الأخرى، مثلاً تقسيم النباتات استناداً إلى طبيعتها إلى أشجار وشجيرات وأعشاب أو اعتماد صفة الجنس لوحدها مثلاً، ويعتبر ليننيوس أشهر مصنف ميكانيكي لأنه أعتمد على الأعضاء الجنسية لوحدها في تصنيف نباتاته، ومن أشهر العلماء الذين أتبعوا هذا النظام هو John Ray , Casealpino.

2- نظام التصنيف الطبيعي Natural system of classification

يعتمد هذا النظام على شكل واحد من اشكال العلاقات بين النباتات، على سبيل المثال استخدام الصفات المظهرية على اختلاف اشكالها ومواقعها في جسم النبات واشهر العلماء الذين اعتمدوا هذا النظام هو De-Candole.

3- نظام التصنيف التطوري Phylogenetic system of classification

يستخدم في هذا النظام اكبر قدر من مختلف الصفات والمميزات التي تمتاز بها النباتات، كما ويوضح درجة القرابة والصلة بين المجاميع النباتية. وكذلك الارتباطات بين الابناء والاباء والاجداد، من اشهر من اتبع هذا النظام C.E.Bessy و A.Engler و Huchinson.

~~~~~

## الاصطلاحات التصنيفية المستعملة في وصف النباتات

لماذا لا يتم الاعتماد على الصفات الخارجية فقط في التصنيف ؟

- i. التغيرات البيئية الموجودة بين افراد النوع الواحد خصوصاً الانواع الواسعة الانتشار مما يؤدي الى وجود طرز بيئية Ecotype الامر الذي يقود الى الخطأ في التشخيص.
- ii. التشابه الحاصل في بعض الاجزاء النباتية كالاوراق.
- iii. مطاطية Elasticity بعض الصفات الخضرية نتيجة لتغاير الظروف البيئية وهذا واضح في حالة الصفات الكمية quantitative characters اما الصفات النوعية qualitative characters فتكون اكثر ثبوتية.
- iv. لا يمكن تحديد أي الصفات من حيث الاهمية فالصفة التي يمكن استخدامها لتشخيص نوع ما قد لا تصلح لنوع اخر . فمثلاً قد نجد ان مجموعة معينة من النباتات تحتوي على جذور تمتاز بكونها ذات اهمية تصنيفية في حين تكون جذور مجموعة اخرى غير مهمة تصنيفياً وهكذا مع بقية الصفات.
- v. لا يمكن تحديد الاهمية التطورية للصفة او بمعنى اخر أي صفة تكون بدائية primitive واياها متطورة , advanced وفي الحقيقة ان افراد أي نوع تحتوي صفات متطورة واخرى بدائية.



الصفات المستعملة كأساس لتصنيف النباتات :

1. التركيب الخلوي كوجود المحتويات الحية وغير الحية ويدخل ضمن هذه النقطة التصنيف الخلوي cytotaxonomy والتصنيف الكيميائي chemotaxonomy.
2. تنظيم الخلايا في الجسم النباتي أي النظام النسيجي tissue system ويعني ترتيب وتنظيم انواع واشكال وابعاد مختلف الخلايا في الاعضاء النباتية المختلفة.
3. وجود او عدم وجود انسجة واعضاء خضرية معينة كوجود الازهار والانسجة الوعائية.
4. تشابه واختلاف التراكيب التكاثرية.
5. المظهر الخارجي العام والدقيق. Gross and micromorphology.

### اصطلاحات عامة GENERAL TERMS

- **Herbaceous plant** النباتات العشبية: وهي نباتات خضراء عادة تموت كلها او جزء منها، بعد انتهاء موسم النمو مثال الباقلاء Vicia والحنطة Triticum والسوسن Iris.
- **Woody plant** نباتات خشبية: يحصل فيها النمو الثانوي وهي اما ان تكون اشجار **Trees** مثال البرتقال **Citrus** والتوت **Morus** او شجيرات **Shrubs** كالجوري **Rosa** وقد تكون النباتات الخشبية اعناب او معترشات **Liana or Lians** وهي سيقان متسلقة **Climbing** وتحتوي على حوالق **Tendrils** تساعد على مسك المسند كالعنب Vitis.
- **Twining plant** وهي نباتات ملتفة عشبية في الغالب او شبه اعناب وهذه النباتات تحتاج الى مسند غير انها لا تحتاج الى وسيلة لمسك المسند كما في ورد التلفون Ipomea والمرير Convolvulus والبلابل Dolichos.
- **Twig** ويعني ساق خشبي فتي او ساق لنبات خشبي يمثل نمو اخر فصل ويكون قصير كما في الفروع الجانبية الخريفية في التين Ficus.
- **Scape** ويعني حامل الزهرة او نورة زهرية يخرج من بين اوراق النباتات اللاساقية كالهندباء البرية Taraxacum والبصل Allium ويسمى النبات. **Scapose**.
- **Cespitose ( caespitose ) plant** نبات ينمو بشكل خصل **tufts** او تجمعات كثيفة كما في حالة بعض الحشائش **Family Gramineae ( grasses )**.
- **Insectivorous plant** نباتات قانصة الحشرات وهذه النباتات تحصل على النتروجين من الحشرات بعد اقتناصها وضمها مثال الجنس Urticularia والذي يسمى بحامول المي ويعود الى العائلة **Lentibulariaceae** الموجودة في جنوب العراق في المستنقعات اما العائلات **Droseraceae** و **Sarracenaceae** و **Nepomthaceae** والموجودة في مناطق اخرى من العالم فان نباتاتها ايضاً قانصة للحشرات.

- Sclerophytic plants وهي نباتات ذات اوراق شبه غضروفية كما في البلوط Quercus (Family Fagaceae) والعنبر Juniperus الذي يعود الى معرفة البذور Gymnosperms
- Succulent plants وهي نباتات عصارية حيث تكون الاوراق والسيقان سميكة وغضة لحمية كما في البربين (لويحة = بويرده Portulaca) والعديد من افراد العائلة Aizoaceae والرمرامية Chenopodiaceae والعائلة Zygophyllaceae. ويعتبر الصبار اكثر مثال على النباتات العصارية.

## ديمومة النبات Duration of plants

- تقسم النباتات بالنسبة لطول فترة حياتها الى مايلي:
- (1) Ephemeral plants نباتات سريعة الزوال حيث ينبت وينمو ويزهر في فترة وجيزة او قصيرة كما في النباتات الصحراوية desert plants
  - (2) Annual plants وهي النباتات الحولية اي تلك التي تكمل دورة حياتها في سنة او اقل كما في الحنطة Triticum والبقلاء Vicia والطماطة Lycopersicon وغيرها.
  - (3) Biennial plants نباتات ثنائية الحول اي تكمل دورة حياتها خلال سنتين تقريبا ففي السنة الاولى يكون النمو خضرى وفي السنة الثانية يكون نمو الازهار والاثمار والبذور كما في بعض انواع نبات Verbascum اذان الدب
  - (4) Perennial plants وهي النباتات المعمرة اي دائمية اي تعيش اكثر من سنتين كما في الاشجار والشجيرات وبعض الاعشاب، هناك بعض النباتات الحولية يمكنها العيش لمدة سنتين وفي هذه الحالة تعتبر ثنائية الحول كما في القطن Gossypium

## الموطن Habitat

- تعيش النباتات اما على اليابسة فيطلق عليها Terrestrial plants اما تلك التي تعيش في الماء فيطلق عليها aquatic plants او hydrophytic plants وهذه النباتات تكون كما يلي :
1. طافية floating plants كما في عدس الماء Lemna (family Lemnaceae)
  2. مغمورة submerged plants كما في الشنبلان Ceratophyllum
  3. Anchored plants راسية أي ان النبات تكون جذوره في الماء بينما معظم جسم النبات يقع خارج الماء كما في حالة القصب Phragmites والبردي Typha
  4. Amphibian plants وهي النباتات التي يمكنها العيش في الماء واليابسة كما في السعد و القصب و الجنس Polygonum amphibium
  5. Parasitic plants نباتات طفيلية وهي تلك النباتات التي تكون فاقده للصبغة الخضراء وتعيش على نباتات اخرى ومن امثلتها نبات الحامول Cuscuta (family Cuscutaceae) والهالوك Orabanche
  6. Epiphytic plants وهي نباتات تعيش على نباتات اخرى كما في بعض افراد العائلة القلقاسيه Araceae والعائلة السحلبية Orchidaceae.

## الاجزاء الخضرية Vegetative parts

### الجذر Root :

وهو جزء النبات الذي يتجه نحو الارض بعيداً عن الضوء ويكون خالياً من العقد والسلاميات وتحاط نهايته بالقلنسوة root cap بالإضافة الى ذلك هناك فروق تشريحية بين الجذر والساق . ينشأ المجموع الجذري Root system من الجذير Radical والذي ينمو الى جذر ابتدائي primary root وهذا بدوره يتفرع الى جذور ثانوية secondary roots وثالثية ... وهكذا.

\*اهمية الجذور من الناحية التصنيفية : بما ان التغيرات التي تظهرها الجذور قليلة لهذا فان اهميتها التصنيفية قليلة هي الاخرى . ان الصفات الجيدة والتي يمكن الاعتماد عليها في التشخيص هي تلك الصفات التي تمتاز بثبوتها من دون أي تتأثر بفعل العوامل البيئية ويمكن الجزم بأن الصفات النوعية افضل من الصفات الكمية في تشخيص النباتات لهذا فأن الصفات التكاثرية Reproductive characters ذات اهمية في التشخيص اكثر من الصفات الخضرية ( لماذا ؟ )

### انواع الجذور

تقسم الجذور الى مايلي:

أ - **النظام الجذري الوتري Tap root system** وفي هذا النظام ينشأ الجذر من الجذير Radical فعندما ينمو الجذير الى الجذر الابتدائي root Primary والذي بدوره ينمو باتجاه عمودي في التربة مكوناً جذراً وتدياً ويوجد هذا النظام عادة في ذوات الفلقتين . ويتخذ الجذر في هذا النظام اشكالاً مختلفة تشمل:

1- الاعتيادية Normal وهي جذور نحيفة غير متغلظة كما في الاستر Aster والبقلاء Vicia

2- خازنة لحمية Fleshy root وهي جذور لحمية متضخمة خازنة للمواد الغذائية وتكون باشكل مختلفة فقد يكون شكلها مخروطي conical كما في الجزر Daucus carota ويكون هذا النوع من الجذور عريض عند القاعدة ويستدق تدريجياً باتجاه الاعلى او يكون الشكل مغزلي Fusiform كما في الفجل الابيض Raphanus sativus او لفتي ( متكور ) Napiform كما في الشلغم ( الفت ) Brassica rapa ( والفجل الاحمر ) Beta وقد يكون اسطواناني cylindrical كما في الفجل الابيض احياناً

ب- **مجموعة الجذور العرضية : Adventitious root** وهي مجموعة من الجذور تنشأ من أي جزء من النبات ماعدا الجذير وتكون بانواع:

1- الجذور الليفية Fibrous root وتكون خيطية الشكل وتخرج او تنشأ من قاعدة الساق نتيجة موت الجذر الابتدائي Primary root كما في الحشائش grasses وقد تنشأ من العقد في السيقان كما في الشليك Fragaria ( الفراولة )

2- الجذور الدرنية Tuberous root وهي جذور خازنة وهذه اما ان تكون متجمعه fascicled كما في البطاطا الحلوة Ipomoea botato والداليا Dahlia او تكون مسبحية monilliform حيث يحتوي الجذر على اجزاء منتفخة كما في الاسبركس Asparagus ويبدو الجذر كالسبحة -like bead

3- الجذور المساعدة او الدعامية prop root وهي جذور تنشأ من العقد الساقية السفلى وتكون هذه الجذور غير متفرعة حتى تصل الى التربة في نبات الذرة *Zea mays*

4- الجذور الطفيلية او الماصة parasitic root وهي تراكيب خاصة ترسلها النباتات الطفيلية داخل انسجة النبات المضيف Host وتسمى بالممصات Haustoria كما في نبات الحامول *Cuscuta*

5- الجذور الطافية او العائمة Floating root وتسمى بالجذور التنفسية كما في نبات الشوره او ابن سينا *Avicennia officinalis*

6- الجذور الهوائية aeral root تخرج من الساق وتساعد على التسلق كما في حبل المساكين Hedrahelix ونقوم احيانا بامتصاص الماء والاملاح مباشرة من المطر كما في حالة النباتات العالقة epiphyte

7- الجذور المتقلصة Contractil root وتسمى بالجذور الشاذة ويوجد في بعض الالبصال والكورمات ، تعمل هذه الجذور على شد النبات الى اسفل حيث تكون نسبة الرطوبة اعلى من المناطق القريبة من سطح التربة وتمنع هذه النباتات التربة من الانحراف.

## البراعم Buds

هو منطقة مرستيمية تحيط بها اوراق جنينية ويعتمد شكل النبات العام يعتمد على نشاط هذه البراعم فعند النخيل يستأثر البرعم القمي بالنشاط كله وفي انواع اخرى يكون البراعم الجانبية هي الانشط عندئذيميل النبات لان يكون متكاثف الاغصان .تقسم البراعم حسب الموقع الى:

1- البراعم القمية او الطرفية (Terminal (apical تقع في قمم السيقان وفروعها ينتج عن نموها تزداد الفروع طولاً "وان توقف النمو الخضري ينمو الى الازهار والنورات.

2- البراعم الجانبية (Lateral (axillary او الابطية تنشأ في آباط الاوراق ينتج عن نموها فروع جانبية

3-براعم اضافية او مساعدة كما في المشمش.

4-قد تنشأ احيانا "في غير مواضعها فتسمى براعم عرضية Adventitious buds وهذه تشاهد في على اوراق البيلكونيا ,قرب الجروح , على الجذور كما في البطاطا الحلوة. تصنف البراعم بالنسبة لتركيبها الى:

1-براعم ورقية Foliage buds ينتج عن نموها اغصان مورقة.

2-براعم تكاثرية Reproductive buds تختص بتكوين اعضاء التكاثر وفي مغطاة البذور تكون ازهارا فتسمى البراعم الزهرية. Floral buds

3-براعم مختلطة Mixed buds تنتج اوراقا وازهارا كما في التفاح .من المؤلف ان تنشط البراعم الورقية في بداية النمو قبل الزهرية الا انه في العرموط مثلا تكون البراعم الزهرية هي السبابة بالنمو.هناك براعم عارية كونها تحتمي باوراق يانعة فقط اما البراعم التي تحاط باوراق حرشفية بنية اللون مغطاة بالشمع فتسمى براعم محمية protectd buds وتعرف ايضا "بالبراعم الشتوية , بعض البراعم لا تنمو اطلاقا" وبعضها الاخر لاينمو الا بعد سبات عدد من السنين وتعرف بالبراعم السابطة. latent buds

## الساق Stem :

وهو جزء النبات الذي يحمل الاوراق والازهار ويمتاز عن الجذر بكونه يحمل اوراقاً ويحتوي على العقد nodes واللاميات internodes وتكون العقد منتفخة في العائلة القرنفلية Caryophyllaceae والحمضية Polygonaceae واحيانا تكون اللاميات متمفصلة مع بعضها ومثل هذا النوع من السيقان يسمى Jointed stems كما في الكازورينا Casuarina وتقسم النباتات من حيث وجود السيقان او عدم وجودها الى نوعين هما:

1. نباتات ساقية cauline leaves ( وتعني ساق ) تتميز هذه النباتات بسيقان نامية فوق سطح التربة وتحمل اوراقاً تسمى بالاوراق الساقية cauline leaves مثال ورد الشمس Helianthus والتوت Morus

2. نباتات لاساقية Acaulescent plants في هذه النباتات يكون الساق مختزلاً فتبدو الاوراق بشكل وردي rosette ويخرج من بين هذه الاوراق حامل او حوامل تحمل زهرة او نورة ويسمى هذا الحامل scape ويوصف النبات scapose كما في النرجس Narcissus واذان الحمل Plantago وهناك حالة في بعض النباتات اذ لا ترتفع كثيراً وتنمو بهيئة كتل tufts وتسمى cespitose (caespitose) واستناداً الى طبيعة الساق قسمت النباتات الى اعشاب herbs وشجيرات shrubs واشجار trees واعناب liana او vine وهناك نباتات تكون خشبية من القاعدة وعشبية من الاعلى تسمى suffrutescent حيث يموت الجزء العشبي منها ويبقى الجزء الخشبي مثال الكبر او الشفاح Capparis والعاقول Alhagi

استناداً الى طبيعة الساق تقسم النباتات الى مايلي:

(1) اعشاب Herbaceous plants وهي نباتات خضراء غالباً وتكون طرية او تكون الساق خشبية وتموت كلها او جزء منها خصوصاً الهوائية بعد انتهاء فصل النمو كالباقلاء Vicia والسوسن Iris

(2) شجيرات shrubs وتمتاز بامتلاكها عدة سيقان تخرج من الارض كالورد الاشرفي Rosa والاس Myrtus والرمان Punica والدفلة Nerium

(3) الاشجار Trees وتمتاز بامتلاكها ساق واحد متفرع من الاعلى كالنخيل Phoenix واليوكالبتوس Eucalyptus

(4) الاعناب Liana (vine) وهي ذات سيقان متسلقة وتحوي على حوالق Tendrils كما في العنب Vitis

(5) Suffrutescent وهي تلك النباتات التي تجمع بين الحالة الخشبية والعشبية حيث يموت الجزء العلوي من النبات ويبقى الجزء القاعدي والذي يكون متخشب ويسمى caudex كما في العاقول Alhagi

## السيقان : stem types

تكون السيقان بانواع ويمكن ايضاحها كما يلي:

السيقان الهوائية: Aerial stem وهي سيقان تنمو فوق سطح التربة تكون السيقان بأشكال تبعاً لاتجاه النمو فيها direction of growth وكما يلي:

- منتصبه او قائمة Erect ينمو عموديا على سطح التربة كما في الذرة Zea mays
- صاعدة Ascending ينمو الساق بصورة مائلة مشكلاً زاوية حادة مع سطح الارض كما في شجيرات الدفلة Nerium والياس Myrtus والورد الاشرفي Rosa
- الضعيفة Weak وهي سيقان لاتستطيع حمل نفسها وتقسم الى مايلي :
  - (a) Decumbent كما في ورد المينا Verbena والفريش او الكطب Tribulus وقد تكون السيقان منبطحه نائمة القمة Procumbent مثل الحنظل Citrullus او تكون Stolonerous مدادة وهي سيقان راكضة runner وتكون جذورا عرضية عند العقد وافراعا هوائية مقابل تلك الجذور وتسمى المسافات بين الافرع الهوائية بالمدادات stolons كما في الفراوله Fragaria
  - (b) Twining او Twiner وهي سيقان ضعيفة تحتاج مسند لتستند عليه كما في المديد Convolvulus وورد التفون Ipomoea
  - (c) المتسلقة Climbing او Climber وهي سيقان ضعيفة تحتاج الى مسند ووسيلة لمسك المسند، تمتلك تحورات خاصة كالحوالق او المحاليق terdils كما في العنب Vitis ورود الساعة Passiflora والليف Luffa ومخلب القط Quincefolium
  - (d) السيقان الترابية subterranean stem وهي سيقان تنمو تحت الارض او التربة وتأخذ اشكالا متعددة منها مايلي: ( تعد السيقان الترابية من وسائل تعميم النبات )
    - (e) الرازومات Rhizomes وهي سيقان تنمو بموازة سطح الارض وتكون جذورا لينة عند العقد كما النيل Cynodon والقصب Phragmites والبردي Typha
    - (f) الدرنتات Tubers ساق خازنة للمواد الغذائية تكون فيها العقد والسلاميات غير متميزة الا انها تحمل براعم كما في البطاطا Solanum tuberosum والالمازة Helianthus
    - (g) الابصال Bulbs ساق قرصية discoid تحاط باوراق خازنة وظيفتها خزن الغذاء والتكاثر كما في البصل Allium cepa والثوم Allium sativum
    - (h) الكورمات Corms ساق خازنة شبه كروية تكون عمودية على التربة وتكون مقسمة بوضوح الى عقد وسلاميات كما في الكلايوس Gladiolus وبعض انواع السعد Cyperus

**ملاحظة :** هناك من يعد السيقان الارضية سيقان متحورة.

السيقان المحورة او الخاصة Modified or special stem وهي بانواع:  
أ -السيقان الشوكية thorns or spriny كما في العاقول والصريم او العوسج Lycium والجهنمية Bougainvillea وهناك بعض انواع الاشواك prickles لاتعتبر سيقانا بل اشواك وذلك لانها تنتزع بسهولة من الساق ولعدم ارتباطها بالحزم الوعائية كما في اشواك الورد الاشرفي Rosa

ب -السيقان المحلاقية tendriller او terdrils كما في ورد الساعة Passiflora والعنب Vitis وهذه هي سيقان نحيفة تلتف حول المسند ومن الجدير بالذكر ان الحوالق اوراقا وليست سيقان

ج -السيقان المسطحة او الورقية adophyll Cl وهي سيقان مسطحة خضراء وهي على نوعين:

\*سيقان مسطحة ذات عقدة واحدة cladodes كما في السفندر Ruscus والاسبركس Asparagus  
\*\*عديدة العقد phylloclades كما في الصبير Opuntia

## شكل الساق shape of the stem

تتخذ الساق اشكالا متعددة هي:

1- الاسطواني (cylindrical) tert كما في افراد العائلة النجيلية Gramineae كالحنطة Triticum والقصب Phragmites ويسمى ساق الحشائش grasses بالمصطلح culms ويكون الساق الاسطواني اما اجوف hollow او صلد sold وقد يسمى الاجوف fistular كما في الحنطة والشعير Hordeum

2- الساق المجنح winged stem وهو ساق ذو زوائد ممتدة على طوله كما في العطر او البزاليا الحلوة Lathyrus وبعض انواع اذان الدب Verbascum

3- ذو الزوايا او المضلع Angular ويكون بانواع:

- أ- ثلاثي الزوايا triangular (Triquetrous) كما في افراد العائلة السعدية Cyperaceae  
ب- رباعي الزوايا Quadrangular كما في الباقلاء Vicia والنعناع Mentha  
ج- متعدد الزوايا Multiangular تطلق على الساق المضلع او متعددة الزوايا كما في بعض انواع  
عرف الديك Amarranthus والمرير Sonchus  
4 - المسطح flattened وهي السيقان الورقية كما في الصبير .

5

## الاوراق Leaves:

وهي عبارة عن تراكيب مسطحة ملحقة بالساق محمولة على العقد الساقية وظيفتها الاساسية القيام بعملية التركيب الضوئي والنتح . وتمتاز اوراق الاغلبية العظمى من النباتات الزهرية بكونها مسطحة الا انها تكون حشفية scaly كما في افراد عائلة الطرفة Tamaricaceae وعائلة الهالوك Orobanchaceae وتدعى الزاوية المتكونه عند اتصال الورقة بالساق بابط الورقة leaf axil وتدعى البراعم الموجودة فيها بالبراعم الابطية axillary buds فالاوراق اما ان تكون قاعدية تسمى basal او radical leaves او اما الاوراق المتصلة بالساق فتدعى بالاوراق الساقية cauline leaves احيانا تتخذ الاوراق القاعدية شكلا ورديا يسمى rosette leaves . وتتباين الاوراق في حجمها فمنها تحتاج الى وسيلة لتكبيرها مثال عدس الماء Lemna ومنها كبيرة يصل طولها الى ستة امتار كما في بعض انواع النخيل وبعض الزنايق المائية Victoria regia حيث يصل طول الاوراق بما فيها السويق حوالي سبعة امتار .

وبالنظر للتغيرات الكبيرة في اشكال الاوراق وقياساتها فمن الضروري دراسة انواع الاوراق وتغيراتاتها على الرغم من ان القيمة التصنيفية للاوراق هي اقل مما للاعضاء التكاثرية وذلك لان الاوراق عرضة للتغيرات البيئية كما ان اوراق انواع مختلفة قد تكون متشابهة . ومن التغيرات الواضحة في الاوراق وتأثيرها الكبير بالبيئة هو النبات Polygonum amphibium حيث تكون اوراقه المغمورة

بالمياه مشرشرة في حين تكون الاوراق فوق سطح الماء غير مشرشرة ويختلف تماما عن تلك الموجودة داخل الماء

## اجزاء الورقة Leaf parts :

تتألف الورقة من الاجزاء التالية :

1. **النصل (blade/Lamina)** : وهو الجزء المنبسط من الورقة ويتصل بالسويق الورقي Petiole اما اذا انعدم النصل تسمى الورقة elaminate ويتألف النصل في معظم النباتات الزهرية من قطعه واحدة وتوصف مثل هذه الاوراق بانها بسيطة simple leaves الا انه قد يتألف من اكثر من قطعه واحدة او نصل وتدعى هذه مثل القطع بالوريقات leaflet ومثل هذه الاوراق تدعى بالاوراق المركبة الاعتيادية (normal compound leaves) كما في التوت Morus والكالبتوس Eucalyptus

2. **السويق او حامل الورقة petiole** وهو تركيب اسطواني عادة نحيف يختلف في طوله في طوله من نبات لآخر كما ان شكله يتباين من الاسطواني الى نصف اسطواني او باشكال اخرى ، ويربط النصل بالساق وفي حالة وجوده تسمى الورقة معنقة petiolate كما في معظم ذوات الفلقتين او يكون معدوما والورقة جالسة sessile وتسمى epetiolate كما في معظم ذوات الفلقة الواحدة ويدعى حامل الوريقة petiolule كما في حالة الاوراق المركبة. يكون السويق petiole باشكال متعددة هي

- i. المجنح winged وهو ذو زوائد على جانبي النصل كما في الحمضيات Citrus
- ii. النصل الورقي phyllodium او phyllode كما في السنط الاسود Acacia
- iii. المنتفخ او المثاني bladder-like كما في ورد النيل Eicchornia crassipes.

## الاذنيات Stipules :

وهي زوج من الزوائد الصغيرة توجد عند قاعدة السويق الورقي وفي حالة وجودها تسمى الورقة بالمؤذنة stipulate leaf و تسمى الورقة غير المؤذنة في حالة عدم وجودها estipulate or exstipulate مثال ورقة الباقلاء Vicia في الحالة الاولى والكالبتوس Eucalyptus في حالة الورقة غير المؤذنة ، اما اذينة الوريقة فتسمى stipel كما في الماش Vigna والفاصوليا Phaseolus وهناك زوائد تقع عند قاعدة نصل بعض اوراق النباتات وتسمى هذه الزوائد الاذنيات النصلية auricle كما في الملوخية Corchorus والمديد Convolvulus تتخذ الاذنيات اشكال مختلفة

- أ- الوريقة Leafy stipule كما في الباقلاء Vicia
- ب- الحرشفية scaly stipule كما في التوت Morus والخباز Malva
- ج- الشوكية spiny stipule كما في النبق Zizyphus والشفلح Capparis
- د- الغشائية membranous او الغمدية sheathing وتدعى هذه الاذينة والتي تكون محيطية بالعقد ocrea او ochrea كما في معظم افراد العائلة Polygonaceae
- هـ- الملتحمة adnate كما في الورد الاشرفي
- و- المحلاقية وهي تراكيب خيطية الشكل تلتف حول المسند كما في العشبة المغربية Smilax من العائلة الزنبقية.



## ترتيب الاوراق على الساق ( phyllotaxy) Leaves arrangements يتخذ تركيب الاوراق على الساق الاشكال التالية :

### 1. المتبادل alternate وفيه تخرج من كل عقدة ورقة واحدة وهو على نوعين :

أ- متبادل ثنائي الصف alternate distichous كما نباتات العائلة النجيلية Gramineae  
ب- متبادل حلزوني spiral alternate او متعدد الصفوف كما في الكالبتوس Eucalyptus ، ان الترتيب المتبادل هو الاكثر شيوعا في النباتات البذرية

### 2. المتقابل opposite وفي هذه الحالة تخرج ورقتين متقابلتين من كل عقدة ساقية وهو على نوعين :

أ- المتصالب Decussate في هذه الحالة تكون الاوراق متقابلة ومتعاكسه كما في ورد المينا Verbena والمينا الشجرية Lantana  
ب- المترابك superposed تكون الاوراق او الوريقات بهيئة صفيين متقابلين في مستوى واحد Imbricate كما في تركيب الوريقات في الورقة المركب ريشيا

3. دائري ( سوري ) whorled or verticillate تخرج اكثر من ورقتين من العقدة الواحد كما في الدفلة Nerium في حالة اللزيج Galium بما ان الاذنيات بحجم الوريقات فتبدو سوارية الا ان الواقع غير ذلك.

## التعرق Venation:

يعني نظام توزيع العروق داخل النصل ، والعروق ماهي الا حزم وعائية او اجزاء من الحزم الوعائية، تبعا لحجم العرق وموقعه وبعده عن التفرعات الرئيسية والتعرق على نوعين :

1- التعرق المتوازي parallel venation العروق بجانب بعضها وتظهر متوازية نظريا ولكنها عمليا متشابكة غير انها متقاطعه وتكون بنوعين :

○ - متوازي ريشي pinnately parallel (unicostate) (وحيدة الضلع) كما في الموز Musa والموز الفحل Canna indica

○ متوازي كفي palmately parallel (Multicostate) (متعدد الاضلاع) تخرج جميع العروق من قاعدة النصل ويكون على نوعين

(1) متوازي كفي متباعد palmately parallel divergent تتجه العروق نحو الحافة وتتباعدها عن بعضها كما في لنخيل الزينة او نخيل المروحة Washingtonia.

(2) متوازي كفي متقارب palmately parallel convergent تخرج العروق من قاعد النصل باتجاه القمة دون ان تلتقي او تتقاطع كما في اوراق الحشائش grasses

2- التعرق الشبكي Reticulate or netted في هذا النوع من التعرق تتشابك العروق ويقسم الى نوعين:

○ ريشي او وحيد الضلع pinnately reticulate (unicostate) في هذه الحالة يوجد عرق رئيسي واحد وتتفرع منه عروق ثانوية وهذه تتفرع الى اصغر فاصغر كما في الخس Lactuca والحمضيات Citrus

○ شبكي كفي او متعدد الاضلاع palmately reticulate (multicostate) تخرج من نقطة واحدة عدة عروق متساوية تقريبا وموزعة داخل النصل بشكل كفي ، ويكون هذا النوع من التعرق على شكلين

(1) شبكي كفي متباعد palmately reticulate divergent كما في العنب Vitis والتين Ficus والخروع Ricinus

(2) شبكي كفي متلاقي palmately reticulate convergent كما في النبق Zizyphus

6

ملاحظة مهمة : التعرق المتوازي يوجد في ذوات الفلقة الواحدة والشبكي في ذوات الفلقتين

اشكال النصل Blade Shapes :

يتخذ نصل الورقة البسيطة اشكالا متعددة منها :

(1) المخرازية **Subulate** تستدق تدريجيا من القاعدة نحو القمة تسمى بالمخراز كما في بعض افراد العائلة القرنفلية Caryophyllaceae كما في الـ Spergularia وحي العلم Mesembryanthemum من العائلة السعدية Aizoaceae

(2) الابرية **Acicular** تشبه الابرة ومقطعها دائري او تحتوي على اخدود كما في الصنوبر Pinus

(3) الشريطية **Linear** وهي طويلة وضعيفة وذات جوانب متوازية اسفنجية طولها الى عرضها 12:1 كما في الحشائش وافراد العائلة السعدية Cyperaceae

(4) الانبوبية **tubular** طويلة ورفيعه وانبوبية كما في البصل Allium cepa

(5) متطاولة او مستطيلة **oblong** مستطيلة تقريبا طولها بقدر عرضها مرتين الى ثلاث مرات كما في

عين البزون Vinca والنناع Mentha

(6) الرمحية **lanceolate** تشبه الرمح والجوانب محدده والنهايات مدببة والنهاية السفلى اكبر من العليا ويتصل السويق الورقي petiole في النهاية السفلى العريضة كما في الصفصاف Salix

(7) رمحية مقلوبة **oblanceolate** شبيه بالرمحية الا ان السويق الورقي يتصل بالجهة الرفيعة كما في اوراق الياس الافرنجي Dodonaea

- (8) **الاهليلجية Elliptic** عريضة الوسط وتضيق عند القمة والقاعدة كما في الياس Myrtus وبعض انواع المطاط Ficus
- (9) **البيضوية Ovate** تشبه البيضة كما في النبق ( السدر ) Ziziphus
- (10) **بيضوية مقلوبة Obovate** السويق يتصل بالجهد الضيقة من النصل كما في ورد الديباج Calatropus والـ Euphorbia
- (11) **قلبية Cordate** كما في التوت Morus
- (12) **قلبية مقلوبة Obcordate** كما في اوراق الحميض Oxalis
- (13) **الملعقة Spatulate** شبيه بالملعقة عريضة في القمة وتستدق تدريجيا نحو القاعدة كما في الاقحوان او القرقوز Calendula
- (14) **سهامية مضمومة القاعدة Sagittate** يكون اتجاه الاذنيات النصلية نحو الداخل كما في Convolvulus
- (15) **المزراقية Hastate** يكون اتجاه الاذنيات النصلية نحو الخارج كما في المرير Sonchus
- (16) **المثلثة Deltoid** كما في الغرب Populus
- (17) **الدائرية Orbicular** او الدرعية Peltate كما في الشفلح Capparis وابو خنجر او اللاتيني Tropaeolum حيث تكون درعيه
- (18) **كلوية Reniform** ما في بعض انواع الخباز Malva
- (19) **المشطية Pectinate** كما في نبات Myriophyllum
- (20) **سيفي Ensiform** كما في نبات البردي Typha والسوسن Iris
- (21) **قيثارية Lyratus** كما في اوراق الفجل Raphanus
- (22) **معينية Rhomboid** كما في اوراق السلق Beta

### قمة النصل Leaf Apex

تختلف قمة نصل الورقة او الوريقات باختلاف النباتات وتكون باشكال مختلفة وكما يلي :

- (1) حاده Acute تكون القمة زاوية حادة كما في الدفلة Nerium
- (2) المحتدة او المستدقة Acuminate قمة حادة ذات جوانب مقعره نوعا ما وتكون مستدقة عند راسها الممتد قليلا مثال الكالبتوس Eucalyptus والصفصاف Salix
- (3) القمية Apiculate تكون القمة مستدقة ومدببة كما في الفاصوليا Phaseolus والبلاب Dolichos
- (4) السفاتية Aristate تنتهي القمة بتركيب خيطي يسمى السفاة awn كما في القنابع glumes وعصيفات Lemmas بعض الحشائش
- (5) المذنب او الذيلية Caudate تنتهي القمة بتركيب طويل لين يشبه المذنب كما في شجرة التين المقدسة Ficus religiosa
- (6) الذيلية المعقوفة Cirrhose تنتهي القمة بزائدة خيطة حلزونية شبيهة بالمحلاق كما في اوراق الجنس Glorrosa
- (7) الشوكية او المستدقة الشوكية Cuspidate تنتهي القمة بشوكة مدببة صلبة كما في الشفلح Capparis ووريقات بعض النخيل Phoenix

- (8) المهمازية Mucronate تنتهي القمة بشوكة قصيرة مدببة صلبة كما في بعض انواع اذان الدب Verbascum
- (9) المقطوعة Truncate تنتهي بقمة وكانها قطعت كما في بعض انواع جنس النعناع Mentha
- (10) المدورة Rouded = Obtuse تكون النهاية مستديرة كما في النبق Ziziphus
- (11) المقروض Retuse تكون القمة فيها انخفاض بشكل زاوية حادة او منخفض كما في الكاروب Ceratonia
- (12) قلبية مقلوبة Obcordate كما في اوراق الجنس Oxalis (الحميض)
- (13) الغائرة Emarginate تحتوي على انخفاض بشكل زاوية منفرجة كما في خف الجمل Bauhinia

### قاعدة النصل Base Blade

- تتأخذ قاعدة نصل الورقة اشكالا مختلفة ومن بعض اشكالها :
- i. المستقيمة او المقطوعة Truncate كما في الغرب Populus
  - ii. المدورة او الدائرية Rounded=Obtuse حيث تكون القاعده محدبة كما في النبق Ziziphus وورد الجمال Hibiscus
  - iii. الحادة Cuneate او هي شبيه براس المثلث كما في الدفلة Nerium والكالبتوس Eucalyptus
  - iv. المستدقة او الممتدة Attenuate حيث تمتد حافتا النصل على جانبي السويق الى ان تلتقيان كما في الاقحوان Calendula والاستر Aster
  - v. المائلة Oblique او غير متناظرة كما في الداتورة Datura
  - vi. القلبية Cordate كما في التوت Morus
  - vii. الدرعيه Peltate كما في اللاتيني Tropaeolum
  - viii. محيطة بالعقد الساقية Amplexicaul يطلق على الورقة الكاملة وذات فصوص قاعدية تحيط بالساق كما في بعض انواع الجنس Euphorbia
  - ix. connate توجد رقتين متقابلتين تلتحم قاعدتها ويخرج الساق من وسطها كما في بعض افراد العائلة القرنفلية Caryophyllaceae
  - x. الممتدة Decurrent حيث تمتد قاعدة الورقة وتلتحم مع الساق فتبدو وكأنها جناح الساق كما في انواع الجنس Verbascum ,
  - xi. Ligulate حيث توجد زائدة عند قاعدة الورقة وهذه تأخذ اشكال مختلفة كأن تكون غشائية او حرشفية كما في افراد العالة النجيلية Gramineae
  - xii. sheathing غمدية وهي ورقة جالسة يمتد فيها غمد يحيط بالساق كما في افراد العائلة النجيلية
  - xiii. الوسادية pulvinate قاعدة منتفخة لسويق الورقة في محل اتصالها بالساق كما في خف الجمل Bauhinia
  - xiv. الاعتيادية Normal وهي ان قاعدة سويق الورقة في محل اتصالها بالساق تكون اعتيادية كما في ؟

### حافة الورقة Leaf Margin

تكون الحافة باشكال مختلفة منها :

1. الكاملة او المستوية Entire تكون الحافة خالية من أي تشقق او تقلص كما في الدفلة Nerium والكالبتوس Eucalyptus والبرتقال Citrus قد تسمى احيانا ملساء

2. المقروضة او المحززة Crenate وتعني ان الحافة ذات اسنان مقطوعة ومدورة وعندما يكون التقرض صغير تسمى الحافة crenulate كما في التوت Morus والمينا الشجرية Lantana
3. المسننة Dentate الاسنان تكون عمودية على الحافة كما في ورد الجمال وكذلك الـ Duranta وورد الجمال Hibiscus وعندما يكون التسنن غير واضح تسمى الحافة denticulate
4. المنشارية Serrate تكون الحافة مجزئة كالمنشار Saw-toothed وتكون متجهة نحو الاعلى كما في الـ Rosa وعندما تكون الاسنان صغيرة تسمى بالمنشارية الدقيقة serrulate وهذا النمط موجود في ايضا في الـ Rosa وقد تكون منشارية مضاعفة double serrate
5. incised ويعني ان الحافة مجزاة الى اجزاء بهيئة فصوص Segments وقد تكون الفصوص مرتبة ريشيا وفي هذه الحالة توجد ثلاث صور هي :  
 أ- ضحلة التجزء الريشي ( احيانا تسمى ضحلة التفصيص الريشي ) pinnatifid عندما تصل الشقوق الى اقل من منتصف المسافة بين العرق الوسطي والحافة  
 ب- متوسطة التجزء الريشي pinnatipartite تصل الشقوق الى اكثر من نصف المسافة بين حافة النصل والعرق الوسطي  
 ج- عميقة التجزء الريشي pinnatisect تصل الشقوق قرب العرق الوسطي ونفس الشئ ينطبق على الورقة عندما يكون التجزء كفا فتكون الاوراق – Palmatifid – Palmatipartite – Palmatisect ان الحالات الاخيرة يمكن ملاحظتها في العنب Vitis و الخروع Ricinus
6. المهلبة Ciliate وتكون ذات اهداب cilia
7. مشرشرة Lacinate كما في ذيل الخروف Reseda
8. شوكية Spinose كما في الـ Centurea
9. مشطية Pectinate كما في الجنس Myriophyllum
10. متموجة Undulate تبدو الحافة متموجة كما في بعض انواع الجنس Pulicaria

## الكساء السطحي للورقة Visture type

يشمل الكساء السطحي للورقة أي تركيب يقع على سطح الورقة أو ينشأ فيها كالشعيرات hairs والحراشف scales والأشواك والمواد الشحمية أو الحمضية ، اما اهمية الكساء ففي حالة الشعيرات يقلل من سرعة الريح لتقليل عملية النتج كما في الدفلة Nerium او Verbascum او الحماية من رعي الحيوانات. وفيما يلي بعض انواع الكساء السطحي:

1. Glabrous املس او امرد او املط كما في الكالبتوس Eulalyprus والحمضيات Citrus
2. Pubescent مصطلح يستخدم للسطح المغطى بشعيرات ناعمة وصغيرة واحيانا يستخدم للحالة المشعرة
3. Puberulent ذو زغب او شعيرات ناعمة مستقيمة صغيرة جدا
4. Pilose ذو شعيرات ناعمة طويلة ومتباعدة ولماعه
5. Villous اشعث و شعيرات طويلة كثة ، ناعمة ولماعه
6. Lante(woolly) شبيه بالصوفي أي شبيه بالصوف ذو شعيرات طويلة كثيفه
7. Tomentose شبيه بالصوفي غير ان الشعيرات قصيرة
8. Comose ذو شعيرات كثيفة بشكل خصل وتوجد في بعض انواع البذور
9. Strigose ذو شعيرات صلبة مائلة ومدببة وقواعدھا منتقخة
10. Hispid ذو شعيرات قاسية مدببة و خشنة صلبة
11. Hirsute متفرقة
12. Scabrous خشن لوجود تراكيب شوكية صغيرة
13. Glandular ذو غدد
14. Glaucous ذو طبقة شمعية مائلة للزرقة
15. ذو شعيرات درعيه Peltate عندما تكون الحراشف شبيهة بالدرع كما في الزيتون Olea

## الوان الاوراق :

يعود اللون الاخضر الى صبغتي الكلوروفيل A , B ومن الصبغات الاخرى صبغة الزانثوفيل ( صفراء او برتقالية ) وصبغة الكاروتين ( الصفراء الباهته ) وهذه الصبغات غير ذاتية وتوجد في البلاستيدات كما توجد صبغات اخرى ذاتية اشهرها صبغة الانثوسيانين ( زرقاء الى حمراء ) يختلف لونها تبعا للصبغة وتوجد في الشوندر Beta والسجاد Coleus

## تغايرات الاوراق Leaves Varition

يلاحظ في بعض النباتات ان شكل الاوراق يختلف تبعا لنوع النبات كما في حالة النخيل حيث تكون مختلفة تماما عند نمو النبات من البذرة وكذلك في حالة الغرب Populus حيث تكون اوراق السيقان القريبة من الارض رمحية Lanceolate تكون اوراق السيقان العليا مثلثة deltoid اما في النباتات المائية فقد توجد حالة تغاير الاوراق heterophylly كما في حالة بعض انواع الجنس Ranunculus او Polygonum هذا من ناحية وهناك جانب اخر هو ترتيب الاوراق على الساق فقد لوحظ ان بعض الاوراق تنترتب بالتبادل في فروع معينة غير انه في نفس الفروع تصبح متقابلة opposite في الاعلى كما نجد ان بعض انواع الفروع العميقة التي تنشا من الاسفل تكون فيها الاوراق دائرية او مجمعه كما في بعض انواع الجنس Linaria

## تحورات الاوراق Leaves modification

لقد تمت الاشارة الى بعض الاوراق المتحورة في البداية كالاوراق الحشفية في الطرفه Tamarix والهالول Orobanch غير انه توجد اوراق محورة اخرى مثال

- (a) الاوراق الشوكية spiny leaves كما في الصبير Opuntia وبعض وريقات النخيل Phoenix  
(b) المحاليق Tendrils وهي تراكيب خيطية تساعد على التسلق كما في تحور وريقات العطر او البزاليا الحلوة Lathyrus وكذلك بعض انواع الباقلاء البرية Vicia  
(c) الاوراق الخازنة كما في الاوراق الحشفية للصل Allium cepa والبربين Portulaca  
(d) الاوراق قانصة الحشرات insectivorous leaves كما في الدورسيرا Drosera والجنس Aristolochia والجنس Urticularia الموجودة عند الاهوار وهذه تستطيع ان تعيش في ترب تفنقر الى النتروجين.

- (e) Scaly leaves وهي اوراق حشفية توجد في الطرف وتغطي البراعم وتلتصق بها.  
(f) الاوراق الزهرية Floral leaves  
(g) الاوراق الجنينية او الفلقة Cotyledons  
(h) القنابات bracts وهي اوراق تخرج من اباطها الازهار وتكون بانواع وسيتم التطرق اليها عند دراستنا للازهار

## انواع الاوراق Types of leaves

تقسم الاوراق عموما الى نوعين

- (1) الاوراق البسيطة simple leaves وهي الاوراق التي لايتجزأ فيها النصل الى وحدات مستقلة كما في الصفصاف وهي الحالة الشائعة بين النباتات.  
(2) الاوراق المركبة compound leaves وهي الاوراق التي يتجزأ فيها النصل الى وريقات leaflet صغيرة او تسمى pinna ومصغرها pinnule وتعادل الورقة الثانوية secondary leaves تقسم الاوراق المركبة استنادا الى عدد الوريقات ونظام ترتيب الوريقات الى مايلي.  
- استنادا الى عدد الوريقات فقد تكون الورقة المركبة وحيدة الورقة Unifoliate كما في الجنس Citrus او تكون ثنائية الورقة Bifoliate كما في خناق الدجاج Zygophyllum او ثلاثية الوريقات Trifoliate وهذه اما ان تكون كفية في حالة عدم وجود الـ Rachis او ريشية في حالة وجوده او تكون عديدة الوريقات Polyfoliolate

ب- استنادا الى ترتيب الوريقات

- 1- مركبة كفية palmately compound وفيها تنشا جميع الوريقات من نقطة واحدة كما في كف مريم Vitex  
2- مركبة ريشية pinnately compound وفيها تستند الوريقات الى محور ريشي Rachis وهي اما ان تكون

- أ- imparipinnate(odd-pinnate) تنتهي بورقة واحدة كما في الـ Rosa  
ب- even-pinnate( paripinnate) تنتهي بزواج من الوريقات كما في الجنس Vicia

ومن الجدير بالذكر ان الوريقات قد تكون مركبة وفي مثل هذه الحالة يطلق على الوريقات الثانوية leaflet secondary (pinnate) اما المحور الذي يحملها فيسمى Rachilla كما في اللبخ Albizia والشوك Prosopis وشوك الشام Acacia وقد تكون الاوراق Tripinnate.

## الزهرة The Flower

تعتبر الزهرة حسب الاعتقاد السائد الآن هو انها غصن محور مؤلفا من ساق قصيرة جدا هو نهاية الحامل والمسماة بالتخت Receptical or torus ويحمل اوراقا لغرض التكاثر او المساعدة عليه ويمتاز الغصن الزهري باختزال سلامياته حيث تبقى الاوراق محتشدة كما ان النمو يتوقف فيه ، لذا فان الوظيفة الاساسية للزهرة هي التكاثر وبقاء النوع وتعد الازهار مهمة من الناحية التصنيفية مقارنة بالصفات الخضرية وذلك لانها تمتاز بصفات ثابتة امام التغيرات البيئية الطارئة ولا تتأثر كما هو الحال بالنسبة للاجزاء الخضرية وتختلف الازهار بالنسبة لاشكالها وحجومها وتنشأ الزهرة من ابط ورقة يقال لها قنابه Bract اما من الناحية التطورية فيعتقد بانها نشأت من تركيب تكاثري يشبه المخروط cone

## اجزاء الزهرة Floral parts

تحمل الزهرة على تركيب يعرف بالحامل الزهري peduncle او الحويل في حالة النورة pedicel الزهرية وتتسع نهاية الحامل لتكون تركيب يعرف بالتخت (receptacle) torus وقد يكون محدب او مقعر او مسطح وتحتوي الزهرة النموذجية اربعة حلقات whorls تمثل الاعضاء الزهرية وهي ابتداء من المحيط الخارجي الى المركز كالآتي:

1. الكاس Calyx هو الحلقة الخارجية ويتكون من اوراق محوره تدعى بالسبلات sepals وتكون خضراء عادة واحيانا تكون ملونه وظيفتها حماية الزهرة

2. التويج Corolla ويتكون من اوراق تدعى بالبتلالات petals وتكون ملونة وظيفتها جذب الحشرات عادة، تدعى حلقتي الكاس والتويج بالاوراق الغلافية perianth او الاجزاء الزهرية الفقيرة Sterial floral parts غير ان الغلاف الزهري يكون غير متميز الى كاس وتويج ويطلق عليه الاصطلاح perigon وتدعى اوراقه بالبتلالات tepals كما في افراد العائلة الزنبقية Liliaceae والعائلة النرجسية amaryllidaceae وقد يكون ال perigon اخضر اللون ويدعى sepaloid perigon او ملون أي تويجي المظهر فيدعى petaloid perigon ان اوراق الغلاف الزهري أما ان تكون منفصلة أي سائبة فتدعى Polyphyllous او متحده فتدعى gamophyllous وقد يتحول الغلاف الزهري الى شعيرات bristles كما في البردي Typha وفي حالة فقدان الغلاف الزهري تكون الزهرة عارية naked flower

3. الاسدية Stamens وهي الاعضاء التكاثرية الذكرية وتحمل حبوب اللقاح وتدعى بمجموعتها جهاز الذكور Androecium وتتألف السداة من خويط Filament ينتهي بجسم منتفخ يسمى المتك anther ويحوي المتك على فصين theca كل منهما يحتوي على كيسين two pollen sac تتكون فيهما حبوب اللقاح pollen grains

4. المدقة او المدقات Pistils وتحتوي الزهرة على مدقة واحدة او العديد من المدقات ومنها يتكون جهاز الانوثة Gynoecium والذي يحتل مركز الزهرة والمدقة تبنى من ورقة او اوراق محورة تدعى بالكرابل Carpels وتتألف المدقة من جزء قاعدي منتفخ يدعى بالمبيض ovary يحتوي داخله على بويضات ovules والتي عند نضجها تكون البذرة seed يتصل بالمبيض من الاعلى تركيب خيطي او شبه خيطي يدعى بالقلم style ينتهي بتركيب متخصص لاستلام حبوب اللقاح يدعى بالميسم stigma، وتدعى الاسدية والمدقات بالاوراق الزهرية الخصبة او الاوراق السبوروية fertile floral part or sporophylls



## ترتيب الاوراق الزهرية Floral phyllotaxy

- تترتب الاوراق الزهرية على المحور الزهري او التخت (Receptacle) بصورة عامة بشكلين هما:
1. الترتيب الحلزوني Spiral arrangement في هذه الحالة يكون التخت مخروطي كما في زهرة الماكنوليا Magnolia
  2. الترتيب الدائري Cyclre arrangment تترتب الاوراق الزهرية باسورة او محيطات دائرية وتدعى الزهرة التي تحتوي على خمسة محيطات pentacytic مثال ورد البوري Petunia والرججية Anagalis والبرتقال Citrus والفجل Raphanus وهناك بعض الازهار تترتب فيها الاوراق الزهرية بترتيبين دائري cyclic وحلزوني spiral كما في الجنس Ranunculus

### عدد الدوائر او الحلقات : Number of cycle or whorls

تترتب اعضاء الزهرة على التخت الزهري بشكل محيطات او اسوره فعندما تحتوي على محيط واحد تدعى monocyclic اما اذا زاد عدد الحلقات اثنين سميت Dicyclic وهكذا صعودا tetracyclic ( الزهرة النموذجية لها اربعة حلقات هي الكاس والتويج والاسدية والمدقات ) اما اذا كان عدد الحلقات الاسدية اثنين فتكون الزهرة في هذه الحالة خماسية الحلقة Pentacyclic اما اذا كان عددها الحلقات تدعى عندئذ Polycyclic

### عدد اجزاء الحلقة : Number of whorl parts

يطلق الاصطلاح merous على عدد الاجزاء في الحلقة الواحدة فاذا كانت الحلقة تحتوي عضو واحد دعيت monomeric او merous على عدد الاعضاء فاذا كانت اثنين سميت dimerous واذا كانت ثلاثة دعيت trimerous وهكذا اذا اربعة دعيت tetramerous ومن الجدير بالذكر ان العدد ثلاثة ومضاعفاته يوجد في نباتات ذوات الفلقة الواحدة عادة اما العدد اربعة فيكون نادر في ذوات الفلقة الواحدة فهو يوجد في الجنس Potamogeton اما في ذوات الفلقتين فان عدد الاعضاء يكون 4 او 5 او مضاعفاتهما بينما يقصر ال pentamerous على ذوات الفلقتين كما في البوري Petunia والكتان Linum ان عدد الكربلات المدقة وعدد الاسدية قد تتفق او لا تتفق مع عدد اعضاء حلقة الكاس والتويج كما في حالة ورد البوري.

### التناظر الزهري : Floral symmetry

ان معنى التناظر يعني القابلية على الانقسام الى اقسام متشابهه من حيث الشكل والحجم بمستوى يمر من مركز الزهرة وينصفها ، فأذا كان بالامكان امرار مستوى واحد يقسم الزهرة الى قسمين متساويين تسمى الزهرة بالزهرة المتناظرة اما اذا كان غير ممكن تكون الزهرة غير متناظرة لذلك يمكن تمييز نوعين رئيسيين من الازهار :

- 1) الزهرة المتناظرة شعاعيا Actinomorphic flower : وهي الزهرة التي يمكن تصنيفها باكثر من مستوي يمر بمركزها ويقسمها الى قسمين كما في عين البزون Vinca والمشمش Prunus والكتان Linum وورد البوري Petunia والباذنجان Solanum
  - 2) الزهرة المتناظرة جانبياً Zygomorphic flower : وهي الزهرة التي يمكن امرار مستوي واحد فقط يقسمها الى قسمين متشابهين كما في الباقلاء Vicia وحلق السبع Antirrhinum والبنفسج Viola
- الزهرة غير المتناظرة Asymmetrical flower او تسمى غير المنتظمة irregular : وهي الزهرة التي لا يمكن تصنيفها الى نصفين متساويين باي مستوي كان كزهرة موز الفحل Canna indica

## توزيع الازهار :

- تقسم الازهار تبعاً لوجود الغلاف الزهري او نقصان احد الحلقات من الغلاف الزهري الى مايلي :
- الزهرة الكاملة complete flower وهي الزهرة التي تحتوي على الاجزاء الزهرية الاربعة أي الكاس والتويج والاسدية والمدقة كما في البانجان Solanum والرمان Punica
- الزهرة الناقصة incomplet flower وهي الزهرة التي ينقصها احد الحلقات الزهرية ولكن عادة يطلق اصطلاح الزهرة الناقصة على تلك التي ينقصها حلقة من حلقات الغلاف الزهري ففي حالة فقدان الكاس تسمى الزهرة asepalous كما في بعض انواع الجنس Euphorbia اما اذا فقد التويج فتسمى apetalous مثل التوت Morus اما اذا فقد كل من الكاس والتويج فتسمى بالزهرة عارية naked flower كما في الصفصاف Salix والغرب Populus
- الزهرة التامة perfect flower او الثنائية bisexual flower او الزهرة الخنيثة hermophrodite وهي الزهرة التي تحتوي على الاسدية والمدقات كما في اغلب ازهار النباتات كما في جنس الحمضيات Citrus وورد البوري Petunia وحلق السبع Antirrhinum
- الزهرة غير التامة imperfect flower او الزهرة الاحادية وهي اما ان تكون الزهرة ذكورية male flower او سداتية staminate flower وهي الزهرة التي تحتوي على الاعضاء الذكرية الزهرة انثوية او مدقية وكربلية وهي التي تحتوي على الاجزاء الانثوية فقط
- الزهرة العقيمة او المتعادلة وهي الزهرة التي تكون الاسدية والمدقة فيها موجودة ولكنها غير فعالة أي عقيمة كما في الازهار الشعاعية لورد الشمس Helianthus يقال للنبات وليس الزهرة بانه احادي المسكن اذا كان حاملاً للازهار الذكورية والانثوية معا كالذرة Zea mays والخروع Ricinus والبردي Typha والخيار Cucumis والرقى Citrulus ويقال للنبات بانه ثنائي المسكن في حالة كون الازهار الذكورية محمولة على نبات والانثوية على نبات اخر كما في التوت.

## اتحاد الاعضاء الزهرية:

تستعمل المصطلحات التالية للتعبير عن اتحاد وانفصال الاعضاء الزهرية

1. متميزة distinct تستعمل للاجزاء الزهرية المتشابهة أي الواقعة ضمن حلقة واحدة كونها منفصلة عن بعضها البعض انفصلاً تاماً :
2. طليقة او حرة free ويعني ان اجزاء الحلقة الزهرية غير ملتحمه مع اعضاء حلقة اخرى كما انها تكون في بعض الاحيان مستعمله بنفس المعنى distinct أي انها في حالة كون اعضاء الحلقات المختلفة حرة وغير مرتكزة على بعضها مثال : البتلات حرة من الاسدية او الكاس
3. متحدة connate وهو اصطلاح يطلق على حالة الاتحاد بين اعضاء الحلقة الواحدة كاتحاد الاوراق التويجية في ورد البوري Petunia وفي المديد Convolvulus ومتوك ورد الشمس Helianthus
4. adnate وهو اصطلاح يطلق على حالة الاتحاد بين اعضاء حلقة مع اعضاء حلقة مختلفة كاتحاد الاسدية بالاوراق التويجية في البانجان Solanum

## الكاس Calyx

يمثل الكاس الحلقة الخارجية من الغلاف الزهري ويتكون من أوراق عقيمة تسمى بالأوراق الكاسية ( سبلات Sepals ) وهذه الأوراق تكون خضراء وطرية وهي الحالة الشائعة في النباتات وتساعد في حماية الأجزاء الزهرية قبل تفتحها كما أنها تقوم بعملية التركيب الضوئي أما من الناحية التشريحية تكون الأوراق الكاسية مشابهة للأوراق الخضرية حيث تمر ثلاث حزم وعائية ناقلة كما هو الحال في الأوراق الخضرية . بعض الأزهار يفقد فيها الكاس فتسمى asepolous flower وفي حالة وجوده أما أن تكون الأوراق الكاسية sepals حرة أو غير ملتحمه ويطلق عليها الاصطلاح polysepalous كما في ازهار الفجل Raphanus وورد البنفسج أو الصورة Viola أما إذا كانت الأوراق الكاسية ( sepals ) ملتحمه فيطلق الاصطلاح gamosepalous أو synsepalous بغض النظر عن درجة الالتحام سواء كان جزئياً أم كلياً ويطلق على الجزء غير المتحد من الأوراق الكاسية بطرف الكاس Calyx limb أما الجزء المتحد فيطلق عليه انبوب الكاس calyx tube قد تكون الأجزاء الحرة بشكل مثلث فيسمى الكاس مسنن toothed وعندما تكون الأجزاء مدورة يسمى بالمفصص lobed وعندما يصل عمق الأجزاء الحرة الى نصف الكاس أو أكثر فيسمى مجزأ segmented أو parted

### تحورات الكاس

قد يتخذ الكاس حالات خاصة فقد يكون :

- (1) ذو مهماز ( مهمازي ) Calcurate ( spurred ) في هذه الحالة يبرز تركيب مجوف له اهمية في جمع الرحيق أو الروائح في بعض الأزهار كما في اللاتيني Tropaeolum ومنقار الطير Delphinium
- (2) الكاس الزغبى Pappus Calyx وهو كاس مختزل وقد يكون بهيئة شعيرات بسيطة ريشية أو حراشف وله اهمية في انتشار البذور وقد دلت الابحاث على ان هذه التراكيب هي في اغلب الاحيان عبارة عن نموات من سطح المبيض وموجودة في زهيرات العائلة المركبة Asteraceae
- (3) الكاس التويجي Petaloid Calyx يكون الكاس في هذه الحالة ملون وليس اخضر اللون هذا النوع يوجد في ازهار عديمة التويج كما في الجنس لالة عباس أو ورد الساعة الرابعه Mirabilis أو يوجد في نبات ذات تويج مختزل كما في منقار الطير Delphinium
- (4) الكاس الغشائي أو الحرشفي Scuious calys أو membrunous كما في كؤوس ازهار عائلة عرف الديك Amaranthaceae كعرف الديك Celosia ورود الدكمه Gomphrena وبعض نباتات العائلة Plumbaginaceae .
- (5) الكاس الثمري Fruiting Calyx وهو كاس حاوي على ثمرة بداخله وفي الغالب يتسع ويتضم هذا الكاس في مرحلة الثمرة كما في جنس السكران Hyoscymaus وسم الفراخ Withania والقرنفل Dianthus ومن الجدير بالذكر ان القرنفل يحتوي على كاس ثانوي أو فوق الكاس epicalyx والكاس الثانوي هو مجموعه من القنابات تحيط بالكاس .

### ديمومة الكاس Duration of calyx

ان فترة بقاء الكاس متصلاً بالزهرة و تختلف باختلاف النباتات فقد يكون الكاس

1. متساقط Caducos حيث تسقط الأوراق الكاسية بعد تفتح البرعم الزهري مباشرة كما في Papaver
2. النفطي Deciduous تسقط الأوراق الكاسية بعد التلقيح والاختصاب وهي الحالة الشائعة في النباتات .
3. الدائمى Persistent تبقى الأوراق الكاسية حتى بعد تكوين الثمار كما في الباذنجان Solanum

اهمية الكاس :

1. المحافظة على الاجزاء الزهرية في حالة البرعم الزهري
2. القيام بصنع الغذاء في حالة كونه اخضر اللون
3. يساعد على انتشار الثمار والبذور
4. المحافظة على الثمار الفتية كما في الكاس الدائمة
5. يساعد على جذب الحشرات عندما يكون ملون

## التويج Corolla

يمثل الحلقة الداخلية من الغلاف الزهري المتميز الى كاس وتويج ويتألف التويج اساسا من اوراق زهرية تسمى بالاوراق التويجية او البتلات petals ويكون عددها مساو الى عدد الاوراق الكاسية الا ان الاخيرة قد تكون اقل من عددها كما في العائلة الخشخاشية Papaveraceae وعائلة البربين Portulacaceae حيث يكون عدد الاوراق الكاسية اثنين الى ثلاثة في العائلة الخشخاشية بينما يكون عدد الاوراق التويجية 4-6... 8-12 ويكون عددها 2 ورقة كاسية في العائلة الثانية بينما يكون عدد البتلات 4-6 ، وتكون الاوراق اقرب الى الاسدية من الناحية التشريحية وذلك لان معظم الاوراق التويجية تحتوي على حزمة وعائية واحدة كما هو الحال في الاسدية . تمتاز الاوراق التويجية بالوانها الزاهية وهذه تساعد على جذب الحشرات ، ويعود سبب هذه الالوان لوجود صبغات الانثوسيانين الدائبة في العصير الخلوي او الى وجود البلاستيدات الملونه chromoplasts او الى وجود الاثنين معا احيانا؟؟ تفرز البتلات رحيقا وذلك لوجود غدد الرحيق عليها وقد يلاحظ على الاوراق التويجية خطوطا ملونه تعود الى موقع الغدد الرحيقية يطلق عليها بدليل الرحيق nectar guide . تكون الاوراق التويجية petals :

1. منفصلة عندئذ يوصف التويج متعدد البتلات Polypetalous كما في الورد الاشرفي Rosa والفجل Raphanus وتتميز الاوراق التويجية السائبة الى جزئين جزء سفلي يعرف بالمخلب claw وجزء علوي يعرف بالطرف او النصل limb كما في الشبوي Matthiola والقرنفل Dianthus وقد يفقد المخلب او يكون قصير جداً كما في الورد الاشرفي Rosa
2. ملتحم او متحد البتلات Gamopetalous او Sympetalous كما في ورد البوري Petunia وحلق السبع Antirrhinum ويتميز التويج الملتحم البتلات الى جزئين يدعى الجزء القاعدي بالانبوب التويجي corolla tube اما الجزء العلوي فيسمى بالطرف التويجي corolla limb ويسمى كل منهما بالفص Lobe وكما هو الحال في الكاس فان عدد الفصوص يمثل عدد الاوراق التويجية التي يتألف منها التويج

## انواع التويج Types of corollas

يقسم التويج الى اشكال متعددة استناداً الى الاسس التالية :

1. عدد الاوراق التويجية
2. تركيب الاوراق التويجية كان تكون ذات مخلب او عديمة المخلب
3. اتحاد واتصال الاوراق التويجية
4. التناظر.

واستناداً الى الاسس المذكوره يقسم التويج الى ماييلي :

(أ) التويج السائب البتلات Polypetalous Corolla

(ب) شعاعي التناظر Actinomorphic ويقسم الى :

1. التويج الصليبي Cruciform وفيه تكون الاوراق التويجية اربعة وذات مخلب وتكون متصالبة في ترتيبها كما في الفجل Raphanus والشبوي Matthiola وكل افراد العائلة الصليبية

2. التويج القرنفلي Coryophyllaceous وهو تويج ذو خمسة اوراق تويجية منفصلة وذات مخلب claw وطرف limb ويكون الطرف متعامد مع المخلب كما في القرنفل Dianthus
3. الوردي Rosaceous وهو القرنفلي اذ انه مؤلف من خمسة اوراق تويجية منفصلة الا انه الاوراق التويجية عديمة المخلب كما في الـ Rosa

(ج) جانبي التناظر Zgyomorrrhoe ويقسم الى

- 1) التويج الفراشي Papllionaceous الاوراق التويجية خمسة هي الخلفية posterior واثنين متمثلتين تسميان بالجنحين wings اما الورقتان الاماميتان فتكونان داخلية وتشبه الاوراق وتسميان بالجؤجؤ keel او carina مثال الباقلاء Vicia والبزاليا Pisum وتتميز بهذا النوع من التويج العائلة الثانوية Papilionoideae من العائلة البقولية Febaceae
- 2) شوارب الملك Caesalpinaceous وهو نوع مكون من خمسة بتلات منفصلة تكون الاوراق الظهرية داخلية وليست كبيرة والورقتين البطنيتين منفصلتين وتكون جميع الاوراق
- 3) منفصلة كما في العائلة الثانوية Caesalpinoideae كالجنس Cassia وخف الجمل Bauhinia
- 4) التويج المتحد البتلات gamopetalous حيث تكون الاوراق التويجية متحدة ويقسم الى :

- الانبوبي Tubular وهو يشبه الانبوب tube like اسطواني كما في الازهار القرصية لنبات ورد الشمس Helianthus
- الجرسى او الناقوسى Campanulate ويكون بشكل الجرس او الناقوس كما في زهرة الجرس Campanula والشجر Cucurbita
- القمعي ( infundibulariform (Funnel form كما في ورد البوري Petunia وورد التفون Ipomea
- العجلي Rotate يكون الانبوب التويجي مختزل وعمودي على طرفه كما في انواع الجنس Solanum والخيار Cucumis والبادنجان والفلفل والطماطة
- الطبقي Solverform وهو يشبه العجلي الا ان الانبوب التويجي طويل كما في عين البزون Vinca وورد اللهب Phlox وورد المينا Verbena
- الزيري Urcelate وهو يشبه الجره جزء سفلي واسع وقمه نحيفة كما في Erica جانبي التناظر Zygomorphic ويقسم :
- 1) اللساني ligulate في هذا النوع من التويج الجزء السفلي منه يكون بشكل انبوبي اما الجزء العلوي منه مسطح ويشبه الشريط أي اللسان مثال الازهار الشعاعية لنبات ورد المينا Helianthus
- 2) التويج ثنائي الشفة 2-lipped ( Bilabiate ) حيث تكون الاوراق التويجية متحد الشفتين وهو على نوعين :
- أ - المنفرج الشفتين Ringent كما في ورد المرجان Salvia حيث تكون الشفتان متباعدتان.
- ب - المغلق او المقنع Personate or masked وفيه تكون الشفتان متقاربتان وكأنه مغلق كما في حلق السبع Antirrhinum

## الزوائد او الملحقات Appendages

تتواجد بعض الاحيان في الغلاف الزهري زوائد ذات فوائد معينة بالنسبة للنبات وهذه هي :

(1) المهماز spur وظيفته افراز الرحيق او خزنة وقد يكون المهماز كاسي في منقار الطير Delphinium او تويجي كما في حلق السبع فرنساوي Linaria

(2) غدد الرحيق Nectary glands : وهي غدد فارزة مكونه من اجسام او خلايا او حراشف اما ان توجد على الزهرة ، ففي الجنس Linaria توجد على شكل قرص حول المبيض او قد تكون بهيئة تراكيب اصبعية فوق التخت كما في عين البزون Vinca او توجد على الاوراق الكاسية في معظم افراد العائلة الصليبية او قد توجد على اعضاء غير زهرية ففي الباقلاء على الاذينات اما في الخروج Recinus فانها توجد على سويقة الاوراق او على الطرف الزهري كما في خناق الدجاج Euphorbia.

(3) الاكليل corona او crown وهي نموات تشبه التويج تنشأ على التويج او بين التويج والاسدية وتاخذ اشكال مختلفة ( حراشف او شعيرات او شكل الكوب ) كما في الدفله Nerium والنجرس Narcisus

## التربيع او الالتفاف الزهري Aestivation ( prefloration )

يطلق الاصطلاح Aestivation على علاقة حافات اوراق الغلاف الزهري ( كاس او تويج ) المتجاوره مع بعضها ضمن العائلة الواحدة في البرعم الزهري ويمكن التعرف على ذلك اما يعمل مقطع عرضي في البرعم او بانتزاع الاوراق الزهرية الواحدة بعد الاخرى وبالترتيب من الخارج الى الداخل ويكون التربيع بنوعين :

(أ) **المصراعي Valvate** : وفيه تتلامس حواف الاوراق الكاسية او التويجية دون تراكب هذه الاوراق كما في دفلة بلادي Asclepias والبريسم او ورد الديباج Calotropis وكذلك ورد القهوة Lagerstroemia

(ب) **المتراكب Imbricate** ويعني ان الحواف الاوراق الكاسية او التويجية متداخله وياخذ التربيع المتراكب الاشكال الاتية :

(1) الملفت Convolute ( contorted ) وفيه كل ورقة كاسية او تويجية تغطي حافة الورقة التي تجاورها من جهة وهي وهي بدورها تغطي بحافة الورقة التي تجاورها من الطرف الاخر أي ان كل ورقة تغطي حافة التي تليها وقد يكون باتجاه عقرب الساعة clockwise كما في عين البزون Vinca او عكس اتجاه عقرب الساعة كما في الدفله Nerium والحميض Oxalis والقطن Gossypium

(2) تراكب تنازلي Descending في هذه الحالة تكون الورقة التويجية الظهرية خارجية الحافتين كما في التويج الفراشي في ال Vicia والبلابل Dolichos

(3) تراكب تصاعدي Ascending في هذه الحالة تكون الورقة الظهرية المقابلة لمحور النبات داخلية الحافتين كما في شوارب الملك وخف الجمل Bauhinia

(4) تراكب رباعي Quincuncial يتميز هذا النوع بوجود ورقتين خارجيتين وورقتين داخليتين وورقة خامسة داخله خارجة كما في الورد الاشرفي.

## جهاز الذكورة ( الطلع ) Androecrum

وهو مجموعة الاسدية stamens وتكون الحلقة الثالثة بعد التويج وتمتاز اسدية اغلب النباتات الزهرية بكونها منفصلة distinct و احيانا تكون متحدة connate من الناحية التصنيفية تعد الاسدية مهمة وذلك لتنوع خواصها مما يجعلها ادلة مهمة من الناحية الوراثية والتصنيفية لذا يلاحظ ان صفاتها وخصوصاً الكمية منها قد تدخل في المفاتيح التشخيصية وتعزى اهميتها الى ثبات خصائصها وعدم تأثرها بالبيئة. تنشا السداة من تحور ورقة خضرية خصبية تعرف بالورقة السبورية الصغيرة microsporophyll وتتألف السداة من جزئين رئيسيين هما:

- A. **المتك Anther** وهو الجزء المنتفخ من السداة والذي يحمل بواسطة الخويط filament ويتكون المتك النموذجي من فصين lobes ( theca ) طولين وكل فص يتكون من كيسين لقاحيين ( pollen sac = ( pollen grain او microspore microsporangium وهما المسؤولان عن تكوين حبوب
- B. **الخويط filament ( stamen stalk )** وهو الجزء الذي يصل المتك anther بالتخت الزهري receptacle ويكون اما صلب solid او احوف hollow وقد يكون اسطوانى cylindrical او خيطي filiform كما في الحشائش grasses وعندئذ يعرف بالخويط التويجي petaloid of filaments كما في الجنس *Saxifraga*

### عدد الاسدية : number of stamens

تختلف عدد الاسدية باختلاف النباتات وتوصف الازهار تبعاً لعدد الاسدية فيها بالاصطلاح ( androus ) فقد تكون monandrous وهو اصطلاح يطلق على الزهرة التي تحتوي على سداة واحدة خصبية كما في الموز الفحل اما اذا احتوت الزهرة على سداتين فتسمى diandrous كما في الشعير او تكون الزهرة ثلاثية الاسدية triandrous كما في الكلايوس *Gladulus* او رباعية الاسدية tetrandrous كما في حلق السبع او خماسية الاسدية Pentamerous كما المديد اما اذا كانت متعددة الاسدية فيطلق عليها polyandrous كما في الورد الاشرقي. *Rosa*

### خصوبة الاسدية Fertility of stamens

عندما يكون المتك منتجا لحبوب اللقاح تكون السداة خصبية fertile stamen ولكن عندما يكون المتك مفقودا او بصورة غير جيدة لا يستطيع ان ينتج حبوب اللقاح و احيانا يكون حبوب اللقاح ولكنها عقيمة ان مثل هذه الاسدية توصف بانها عقيمة sterile وتسمى staminodes وقد تكون تويجية المظهر petaliferous كما في الموز الفحل *Canna indica* او غدية كما في بعض الحمضيات *Citrus* او تكون خيطية كما في ابرة العجوز. *Erodium*

### حبوب اللقاح Pollen grains

يتألف المتك من كتله من الخلايا غير المميزة وهي خلايا حشوية وبتقدم المتك في النمو وبعد مرور هذه الخلايا بمرحلة معينة تتكون مايسمى بخلايا ام اللقاح pollen mother cell نتيجة الانقسامات الاعتيادية وتمر خلايا ام حبوب اللقاح بانقسام اختزالي وبهذا تتكون مجموعة رباعية من حبوب اللقاح tetrad خلايا ام حبوب اللقاح يطلق عليها microsporo-cytes ان المجموعة الرباعية tetrads اما ان تنتشر بهيئتها الرباعية او تنتشر بهيئة خلايا انفرادية الشكل في العائلتين العشارية Asclepiadaceae والسحلبيية Orchidaceae تتجمع حبوب اللقاح بكتله شمعية تسمى اللقاح pollinium (pl. pollinia) ويتألف كل لاقح من كيس

شمعي يتصل بامتداد او ذراع او ذنب ثم يلتقي ويلتصق الاثنان بالقرص اللاصق . adhesive disc  
بالنسبة لحبوب اللقاح فاشكالها تختلف باختلاف النباتات فهو يتراوح بين الشكل العصوي الى الكروي المفلطح  
ومن اهم الاشكال مايلى:

- المتطاوول Prolate
- الاهليلجي الطويل Long Ellipsoid
- الاهليلجي Ellipsoid
- شبه الكروي Subspherical
- المفلطح Oblate

وتحتوي حبة اللقاح اما على اخاديد او فتحات sulcus or pore فحبة اللقاح عندما تحتوي على فتحة واحدة  
او اخدود واحد تسمى monoporate or monosulcate وعندما تحتوي على اثنين تسمى bisulcate or  
biporate وعندما تحتوي على ثلاث فتحات تدعى trisulcate or triporate او عديدة الاخاديد والشقوق  
polysulcate or polyporate وتحت السطوح الخارجية لحبة اللقاح بأشكال مختلفة لها اهمية تصنيفية  
كبيرة على مستوى العوائل والاجناس والانواع فقد تكون السطوح ملساء او شبكية reticulate او ( شكل  
خلايا النحل Alveolate (او درنية tuberculate او مخططة striate او مثقبة foreate او perforate او  
الشائك echinate or spinulate اوصلبة verficulate او ملساء smooth.

### طريقة تفتح المتك mode of anther dehiscence

عندما ينضج المتك يتشقق جداره وينثر حبوب اللقاح ويتم تفتح المتك بطرق مختلفة هي:

i. التفتح الطولي Longitudinal dehiscence ويتم التفتح طوليا على طول كل فص من فصوص  
المتك وهذا النوع من التفتح هو الاكثر شيوعا في النباتات الزهرية . ويكون التفتح الطولي بأشكال  
هي

أ) Extrorse - وفيه يكون المنفتح باتجاه الخارج ويلاحظ هذا النوع من التفتح في العائلة القرعية

Cucurbitaceae والعائلة السوسنية Iridaceae

ب) Introrse - وفيه يكون التفتح باتجاه الداخل كما في عين البزون Vinca والاسل Juncus

ج) Laterorse - وفيه يكون التفتح جانبيا كما في افراد العائلة الشقيقة Ranunculaceae

ii. التفتح السامي porocidal dehiscence ويتم التفتح بواسطة ثقب عند قمة فصوص المتك كما في

الطماطة Lycopersicon ونبات العائلة Ericaceae

iii. المستعرض Transverse dehiscence وفيه يكون خط الانفتاح مستعرض في كل فص كما في

الباميا Abelmoschus esculantus والـ Euphorbia

iv. التفتح المصراعي Valvulate dehiscence ويتم التفتح بواسطة ثقب وتكون هذه الثقوب مغطاة

بواسطة غطاء او مصراع كما في نبات الدارسين Cinamomum وافراد العائلتين

Berberidaceae والعائلة Lauraceae.

### اتصال المتك بالخويط Anther attachment :

يتصل المتك بالخويط بأحدى الصور التالية:

1. الاتصال القاعدي Basifixed يكون المتك نهائي الموقع نسبة للخويط ويتصل بالخويط بالقاعدة كما Iris
2. الاتصال الظهري Dorsifixed يتصل الخويط على امتداد جهة الظهر به ويكون المتك ثابت غير



متحرك كما في اللبلاب Dolichos والفاصوليا Phaseolus والحمضيات Citrus  
3. الاتصال الطليق او الحر او القلق Versatile وهو نوع من الاتصال الظهري غير ان هذا الاتصال غير ثابت فالتك يمكنه الحركة بتأثير الرياح كما في معظم النجيليات grasses وورد الساعة Passiflora

### الاتحاد السدوي Synstemony

تتحد الاسدية بصورتين:

1. الاتحاد بواسطة الخويطات by filaments وتوصف الاسدية بالاصطلاح (adelphous) وله ثلاثة صور:

أ- الاسدية وحيدة الحزمة monadelphous في هذه الحالة تتحد جميع اسدية الزهرة في حزمة واحدة ويطلق على هذه الحزمة بالعمود السدوي staminal column ويكون انبوب تخترقه الدقة كما في افراد العائلة

الخبازية Malvaceae كالقطن Gossypium والخباز Malva

ب -ثنائية الحزمة Diadelphous متحدة الاسدية بحزمتين كما في نباتات المجموعه الفراشية papilionoideae حيث تحتوي الزهرة عشرة اسدية تسعه متحدة في مجموعه واحدة وسداة واحدة حره طليقة كالباقلاء Vicia

ج - عديدة الحزم polyadelphous في هذه الحالة تكون الخويطات متحدة باربعة حزم كما في ازهار الحمضيات Citrus ولا يشترط في هذه الحالة ان يتساوى عدد الاسدية في الحزمة الواحدة

د -الاتحاد بواسطة المتوك by anthers تتحد المتوك مع بعضها وتبقى الخويطات وتدعى syngeneceous في هذه الحالة تحيط المتوك بالمدقه في جزئها العلوي كما في انواع العائلة المركبة Asteraceae كورد الشمس Helianthus وهناك حالة تتلامس فيها الاسدية من دون ان تتحد فتسمى connivent بينما في حالة ورد الشمس يكون التحام المتوك. connation

### اتحاد الاسدية بالاعضاء الزهرية الاخرى Adnation of stamens

عندما تكون الاسدية حره منفصلة عن بعضها توصف بانها distinct اما اذا كان الاتحاد مع اجزاء اخرى فيطلق على الاتحاد الاصطلاح adnation ويكون بصورة مختلفة وهي كالاتي:

1. فوق ورقية ( فوق غلافية ) Epiphyllous وهي ظاهرة ارتكاز او اتحاد الاسدية بالغلاف الزهري غير المتميز الى كاس كما في بعض افراد العائلة الزنبقية Liliaceae

2. فوق كاسية Episepalous وهي ارتكاز الاسدية على اوراق الكاس كما في الجنس Potamogeton

3. فوق تويجية Epipetalous وهي ظاهرة ارتكاز الاسدية على الاوراق التويجية كما في العديد من نباتات العائلة الباذنجانية Solanaceae وكذلك عائلة ورد المينا Verbenaceae

4. فوق مدقيه Gynandrous وهي ظاهرة اتحاد الاسدية بالمدقة كما في العائلة السلحبية Orchidaceae ويتكون نتيجة اتحاد الاسدية بالمدقة تركيب يسمى gynostemium كما في الحلابلاب Cynanchum

### تباين الاسدية Heterostemony

ناخذ الاسدية من حيث اطوالها حالتين هما:

\* **الاسدية طويلة الاثنتين Didynamous** في هذه الحالة تحتوي الزهرة اربعة اسدية سداتين طويلتين

وسداتين قصيرتين كما في حلق السبع Antirrhinum وورد المينا Verbenaceae

\*\* **الاسدية طويلة الاربع Tetradynamous** في هذه الحالة تحتوي الزهرة على ستة اسدية اربعة اسدية طويلة وتمثل الحلقة الداخلية واثنين قصيرتين وتمثل الحلقة الخارجية كما في معظم افراد العائلة الصليبية

Brassicaeae كالشبوي Mathiola والفجل Raphanus والشلغم Brassica.

## الجهاز الانثوي Gynoecium

هي عضو التكاثر الانثوي في الزهر هو يحتل مركزها وقد يتكون من مدقه واحده Pisil او اكثر وتتكون المدقه من الكرابل carpels (تشبه الورقه من حيث التشريح، خاليه من الكلورفيل، فيها 3 حزم وعائيه) وعلى حافات الكرابل تحمل البويضات ovules التي تنضج الى بذور بعد الاخصاب. ابسط شكل للمدقه يتألف من كربله واحده ( في الانواع الواطنه كانت مفتوحه النهايه لكن بالتدرج انطوت الحافتان طوليا" باتجاه العرق الوسطي والتحمتا مكونه مايعرف بالمبيض ovary وعلى خط التحام الحافتين في الحافه الداخليه ينشأ نسيج حشوي يسمى المشيمه placenta ترتبط به البويضات يحتوي المبيض على غرف locule تحتضن البويضات. يتراوح عدد البويضات 1 كما في التمر الى مليون كما في بعض الاوركيدات، يمتد من قمه المبيض تركيب اسطواني رفيع اما مجوف او صلد هو القلم style الذي ينتهي بتركيب يستقبل حبوب اللقاح وهو الميسم stigma .

ان احد الصفات المهمه لمغطاه البذور هي وجود البويضات داخل تركيب مغلق هو المبيض وعليه فان حبوب اللقاح لاتصل مباشره لها واما تنمو مكونه انبوب من الميسم الى المبيض مروراً بالقلم ( صفه مميزه عن عاريات البذور).

ان الخصائص التي يتميز بها الجهاز التكاثري في الزهره لا تخضع للمؤثرات الخارجيه البيئيه بسهولة لذا اصبحت لها قيمه تصنيفيه كبيره وخاصه في العلاقات الواثيه بين الانواع والاجناس والعوائل النباتيه.

### اشكال الجهاز الانثوي Types of gynoecia

يقسم من حيث عدد الكرابل الى:

- 1- احادي الكربله unicarpous = monocarpellate = simple pistil كما في الباقلاء
- 2- عديد الكرابل polycarpous = malicarpellate = compound pistil ويكون على احد النوعين:
  - أ – سائب الكرابل Apocarpous : الكرابل بسيطه تترتب اما بشكل مخروطي كما في Ranunculus او بشكل دائري كما في Alisma ( حاله المخروطيه هي دليل حاله بداءه والدائريه حاله تطور).
  - ب – متحد الكرابل Syncarpous : تتحد الكرابل مكونه مدقه مركبه كما في الخيار وقد يقتصر الاتحاد على المبيض او تلتحم الاقسام الثلاثه فتبدو من الخارج مكونه من كربله ومبيض و قلم وميسم واحد.

هنالك دلائل لمعرفه عدد الكرابل هي:

- 1- فصوص المبيض ovary lobes : عدد الفصوص = عدد الكرابل ( الجيرانيوم)
  - 2- عدد الغرف (locules) (cells) : في حاله التمشيم مركزي فان عدد الغرف = عدد الكرابل ( البتونيا)
  - 3- المياشم الجداريه parietal placentae : في التمشيم الجداري عدد المياشم = عدد الكرابل ( الخيار)
  - 4- الاقلام ( او فروع القلم) styles : في بعض الانواع قد يحتوي على اكثر من قلم او قد يتفرع القلم في النهايه = عدد الكرابل ( الكتان).
  - 5- فصوص الميسم او تفرعاته stigmatic lobes : في حاله الميسم مفصص ( الزنبق) او متفرع ( عباد الشمس) = عدد الكرابل.
- بطبيعته الحال يمكن الاعتماد على اكثر من دليل للحكم على عدد الكرابل.

## الميسم Stigma

هو جزء المدقه الذي يستقبل حبوب اللقاح في النباتات البدائية لم يكن هذا التركيب ظاهراً او متميزاً الا انه في النباتات الاكثر رقياً " يظهر بوضوح، عادة ما يكون خشن السطح ويفرز سائلاً لزجا وحلو المذاق في تسهيل التصاق حبوب اللقاح، يأخذ الميسم اشكالاً " متعددة منها الكروي capitate او قرصي discoid او مسطح او شريطي linear او ريشي plumose كما في الحنطة او شعاعي radiate .

## القلم style

وهو التركيب الذي يتصل بالميسم من الاعلى وبالمبيض من الاسفل ، في النباتات البدائية لا يتميز القلم اما في في المدقه ملتحمه الكرابل ( الاكثر رقي) يظهر اكثر تميزاً " وهو رفيع طويل كما في الزنبق ومنبسط تويجي ملون كما في السوسن وموز الفحل وشصي كما في النخيل كما في الخشخاش، تختلف الاقلام في اطوالها ضمن النوع الواحد وتعرف هذه الظاهره بالتباين القلمي heterostyly .

## موضع القلم من المبيض

- 1- قمي terminal ينشأ من قمه المبيض وهذه سائده كما في عين البزون.
  - 2- جانبي lateral يظهر على احد طرفي المبيض نتيجة لعدم نمو جوانب المبيض بصورة متساويه فيكون بطني ventral وقع على م التدريز البطني كما في اللبلاب وظهري dorsal كما في منقار الطير او قد يكون قاعدي basal كما في الفراوله .
  - 3- قاعدي مركزي gynobasic في هذه الحاله يتكون المبيض من عدد من الفصوص وينشأ القلم من بينها صاعداً " كما في العائله الشفويه Lamiaceae .
- ( قد يبقى القلم ملازماً " المبيض الى مابعد الاخصاب مثل البقوليات وقد يسقط مخلفاً " ندبه كما في المشمش )

## المبيض Ovary

هو الجزء المنتفخ من المدقه يحمل بداخله البويضات عاده على سطح التخت ويوصف بكونه جالس sessile او قد يكون معنق ، وفي انواع اخرى يحمل المبيض ومعه الاسديه بحامل واحد ويعرف بـ androgynophore كما في ورد الساعه .

## التميشم Placentation

- هو نظام او ترتيب المشايم ومعها البويضات ، في النباتات الواطنه الزهرية تنتشر البويضات على كامل السطح الداخلي للكربله، الا انها في النباتات الاكثر رقياً " تنتظم بأحد الاشكال الاتيه:
- (a) حافي Marginal يتكون المبيض من كربله واحد وفيه غرفه واحد وتمتد مشيمه واحد على طول خط التحام حافتي الكربله كما في الباقلاء
  - (b) جداري Parital يتكون المبيض من اكثر من كربله وفيه غرفه واحد وتنشأ المشايم على امتداد او خط الالتحام بين حافات الكرابل لذا عدد الكرابل = عدد المشايم، كما في ورد الساعه
  - (c) مركزي ( محوري ) Axil هذا الشكل يحدث في المبيض المركب عديد الغرف وتتصل البويضات بمحور وسطي يتكون نتيجة لانطواء حافات الكرابل الى الداخل والتحامها عند الوسط كما في البرتقال والطماطه .

- (d) مركزي طليق Free Central ينشأ من مبيض مركب فيه غرفه واحده وتتصل البويضات بمحور وسطي ينهض من قاعده المبيض دون ان يصل الى قمته او يتصل بجداره كما في العائله القرنفليه، يعتبر هذا التمشيم الاكثر تطورا مقارنة بالانواع الاخرى.
- (e) قاعدي Basal ينتج هذا النوع من اختزال المحور الوسطي للتمشيم المركزي الطليق وعليه قد يحتوي على بويضه واحده كما في التمرز
- (f) قمي ( معلق ) Apical للمبيض عاده غرفه واحده ويظهر البويض معلقه في سطحه كما في العنجاوص ويعتقد ان هذه الحاله هي اختزال للتمشيم الجداري.

~~~~~

موقع المبيض ovary position

- يعتبر موقع المبيض ذو قيمه تصنيفيه مهمه وعلاقته بالاجزاء الاخرى وهو على :
- 1- زهره سفليه الاجزاء hypogynous flower = مبيض علوي superior ovary :
في حاله نشوء الغلاف الزهري والجهاز الذكري من تحت المبيض ودون ان يكون لها اي اتصال به ، يعتبر هذا النوع من اكثر الانواع شيوعا" كما في الحمضيات.
 - 2- زهره علويه الاجزاء Epigynous flower = مبيض منخفض inferior ovary :
يغوص المبيض في نسيج الانبوب الزهري حتى قمته بحيث يصعب فصله وترتكز باقي الاجزاء عند القمه كما في الخيار.
 - 3- زهره محيطه الاجزاء perigynous flower = مبيض نصف منخفض half-inferior ovary :
يجلس الجهاز الانثوي داخل تركيب فنجاني يعرف بالاناء الزهري فيما ترتكز الاسديه والاوراق التوجيهه والكاسيه على حافته فتبدو محيطه به كما في الورد الاشرفي.



الانظمه الزهرية (النورات) Inflorescences

هي مجموعه ازهار تنتظم على حامل واحد هو المحور الزهري rachis تحمل الازهار في عدد من الانواع النباتيه بشكل انفرادي حيث تقع الزهره على قمه حال خاص بها وتسمى النوره الانفراديه solitary تختلف النورات في حجمها وفي عدد الازهار التي فيها ، ترفع النوره على جزء من الساق يعرف بالحامل peduncle ، في بعض النورات لاتوجدسيقان هوائيه لذا فأن حامل النوره ينشأ قرب التربه ويسمى scape كما في البصلوقد تحمل كل زهره على حويل خاص بها ، اما اذا كانت الازهار بدون حامل تسمى جالسه sessile ، في بعض النورات تحاط الزهره بقنابه صغيره bracteale وفي بعض الانواع تحاط بحلقه من القنبيات تعرف بالظرف الزهري involucre كما في الجزر ، تعتبر النوره (مخلخله) loose اذا كانت الازهار فيها متباعده وقد تكون (مصمده) compact ان احتشدت فيها الازهار بشكل يغطي المحور الزهري كما في التوت والشعير ، وتوصف بانها قميه (طرفيه) terminal اذا وقعت في نهايه الساق، تكون النوره بسيطه simple ان اكن لها محور زهري واحد اما اذا تفرع الى عدد من المحاور فتكون معقده compound.

اشكال الانظمه الزهرية Types of Inflorescences

تقسم الانظمه الزهرية الى

- 1- النورات غير المحدوده Racemose التي تقسم الى
 - أ - غير محدوده بسيطه simple racemose وتندرج تحتها
 - 1- عنقوديه Raceme يستطيل فيها المحور ويحمل على امتداده ازهار على حويلات وتكون اعناق الازهار السفلى اطول مما فوقها وتتفتح الازهار بالتتابع كما في الفجل.
 - 2- سنبلية Spike تشبه العنقوديه لكن ازهارها غير معنقه كما في ورد المينا.
 - 3- هريه Catkin نوره عقوديه اوسنبلية معدومه التويج وفي الغالب لكل زهره قنابهوقد تطون متدليه وتسقط بعد التزهير كما في الجوز.
 - 4- مشطيه Corymb تشبه العنقوديه لكن تختلف عنها بان الازهار تنتظم عند القمه بمستوى واحد والاصغر عند مركز النوره كما في الجنبيه *Cardaria sp*
 - 5- مظليه (خيميه) Umbel فيها تبدو الحويلات كأنها قد خرجت من نقطه واحده وهي تقريبا متساويه تشبه المظله وغالبا ما يوجد قنابات ظرفيه تحتها كما في البصل.
 - 6- اغريضيه Spadix هي نوره سنبلية الا ان المحور فيها سميك ولحمي وازهارها صغيره وجالسه احاديه الجنس وتحاط بقنابه كبيره قد تكون ملونه تسمى spathe كما في نخيل التمر لكن القينوه فيها خشبيه.
 - 7- رأسيه Haed ياخذ المحور فيها شكل مسطح او محدب يحمل عددا من الازهار الصغيره المحتشده جالسه تتفتح من المحيط الخارجي الى الداخل وقد تحاط بقنابه مكونه الظرف الزهري كما في زهره الشمس وفي مثل هذه الحاله تبدو النوره بكاملها زهره واحده لاحتوائها نوعين من الازهار الخارجيه شريطيه كل واحده منها تشبه ورقه تويجيه والداخلية صغيره انبوبيه التويج.

ب- غير محدوده مركبه Compound racemose يتفرع المحور الرئيس في هذه النوره الى عدد من الافرع الثانويه التي بدورها تحمل ازهارا بنفس الترتيب ومنها :

- 1- عنقوديه مركبه Compound raceme كما في الذره البيضاء.
- 2- سنبلية مركبه compound spike كما في الحنطه.
- 3- مشطيه مركبه compound corymb كما في القرنابيط.

4- مظهره مركبه compound umbel كما في الكرفس.

2- النورات المحدوده Cymose

يتميز هذا النظام الى ما يلي :

أ- احادية الشعبة: monochasium وفيها ينتهي الحامل الزهري بزهره في اعلاه وثم ينشأ تحته فرع جانبي واحد ينتهي بزهره اصغروقد تنتهي النوره بزهرتين فقط فتسمى بسيطه simple monochasium كما في السوسن ، اما اذا تكررت عمليه التشعب بمحاور جانبيه فتكون النورات مركبه compound monochasium وتظهر هذه بعدة اشكال اهمها:

1. النورة العقربيه Scorpioid cyme وتحمل الازهار المتعاقبة بصوره متبادله على جهتين متعاكسة

(يمين وشمال) وتبدو النورة متعرجة كما في الكتان Linum

2. النورة القوقعية Helicoid cyme وفيها تنشا الازهار الجانبية على محاور متعاقبة تقع كلها في

مستوى واحد وعلى جانب واحد وتبدو النورة مقوسة كما في جنس ورد لسان الثور Anchusa

ب- ثنائية الشعبة dichasium : ينتهي الحامل بزهره قمية لكن ينشأ تحتها في ان واحد فرعان جانبيين وتكون الزهرة الوسطى هي الاقدم عمرا" ، اذا توقف تكوين الازهار فتسمى بسيطه simple dichasium كما في Convolvulaceae ، اما اذا تكررت عمليه التشعب بمحاور جانبيه فتكون النورات مركبه

compound dichasium كما في Ruta

ج- عديدة الشعب polychasium : ينتهي المحور بزهره ثم ينشأ عدد من المحاور الجانبية بشكل دائري وهناك تشابه بين النورة المظلية وعديدة الشعب لكن في النورة المظلية تكون الزهرة الوسطى هي الاصغر عمرا"

3- النورات المختلطة mixed inflorescence ومن اشهرها هي thyrses وهي نورة محتشدة الازهار عنقودية مركبة تاخذ الى حد ما شكلا" اسطوانيا" وفيها المحور الرئيس غير محدود النمو بينما الفروع الجانبية محدودة ثنائية الشعبة كما في الخروع

4- النورات الخاصة special inflorescence : تضم 3 اشكال:

I. النورة الكاسية cyathium تعد هذه النورة من الخصائص المميزة لجنس اليوفوبيا وهي تتكون من:

أ- تركيب قذحي الشكل هو بمثابة ظرف زهري involucre ينتج من التحام 4-5 قنابات ظرفية وتقع على حافة هذا الظرف واحدة او اكثر من الحراشف الغدية

ب- 5 ازهار ذكورية عارية تتكون كل منها من سداة وحويل ويلاحظ بينه وبين الخويط نقطه ارتباط متميزة

ج- زهرة انثوية واحدة تقع وسط النورة تتكون من مدقة ذات 3 كرابل متحدة و3 اقلام و6 مياسم ، تحمل المدقة على حويل طويل بحيث تخرج الزهرة عند النضوج الى خارج فوهة الظرف الزهري (اختزل عدد وتركيب الازهار لذا تبدو كزهرة واحدة).

II. النورة اللولبية verticillate cyme تتواجد في العائله الشفوية حيث تترتب الازهار بنظام متقابل وتظهر عند كل عقدة من عقد الساق حلقة من الازهار تحيط بها

III. النورة التينية syconium وهي نورة راسية متحورة ينمو فيها المحور بهيئه تركيب لحمي مجوف له عند القمة فتحة صغيره هي الفوية يحيط بها عدد من الحراشف ويحتضن التجويف ازهار كثيرة

احادية الجنس تقع الذكورية منها في الاعلى والانثوية في الاسفل تتحول هذه الزهرة بعد الاخصاب الى ثمرة مضاعفة تعرف بأسم syconus وهي ثمرة التين Ficus

المعادله الزهرية floral formula

وهي مجموعه من الرموز التي تدل على تركيب زهره واحده او على عائله نباتيه بشكل عام

الرموز

1. الزهره المتناظره شعاعيا" $\oplus$
2. الزهره المتناظره جانبيا" $\%$
3. الزهره غير المتناظره L
4. الزهره ثنائيه الجنس $\begin{smallmatrix} \uparrow \\ \oplus \end{smallmatrix}$
5. الزهره المذكره $\begin{smallmatrix} \uparrow \\ \otimes \end{smallmatrix}$
6. الزهره المؤنثه $\begin{smallmatrix} \uparrow \\ \oplus \end{smallmatrix}$
7. الزهره العقيمه π
8. الكأس الزهري K
- (a) الكأس الزهري ذو خمس اوراق منفصله K_5
- (b) الكأس الزهري ذو خمس اوراق ملتحمه $K_{(5)}$
- (c) الكأس الزهري عديد الاوراق المنفصله K_∞ او ∞
- (d) الكأس الزهري عديد الاوراق المتحده $K_{(\infty)}$ او (∞)
- (e) الكأس مفقود (زهره لا كأسيه) K_0
- (f) الكأس متميز الى حلقتين خارجيه وداخليه من جزئين منفصله K_{2+2}
- (g) الكأس زغبى K_p $p = \text{pappus}$
9. التويج C
- كما في الكأس في اتحاد وانفصال الاوراق التويجيه
- في حاله التويج الفراشي يرمز له بـ $C_{1+2+(2)}$
- في حاله ان عدد اجزاء التويج غير ثابت فيكتب العدد كما يلي (يعني التويج من 4-12 اجزاء) C_{4-12} .

10. جهاز التذكير A

- (أ) 5 اسديه حره A_5 (ب) 5 اسديه متحده $A_{(5)}$
- * في حاله الاسديه ملتحمه بالاوراق التويجيه يرمز لها $C_{(5)} A_{(6)}$

11. جهاز التانيث G

- (a) مدقه مرتفعه $\overline{G}$
- (b) مدقه منخفضه $\underline{G}$
- (c) مدقه مركبه من 3 كربلات متحده ومبيض مرتفع $G_{(3)}$

12. Perianth = P = الغلاف الزهري غير المتميز الى كأس او تويج.

~~~~~

## الثمار

هي مبيض الأزهار الناضج ، وهي العضو الذي يحمل البذرة ويحميها، و بهذا فهي تشكل وسيلة تكاثر و نشر للبذور لدى النباتات المزهرة .كثير منها تؤتي ثمارها الصالحة للأكل بالنسبة للإنسان والحيوان. تتكون الثمار من نضوج الزهرة أو الأزهار زيم الذي يتكون منه كل جسم الثمرة يتوقف تكوين الثمار والبذور على حدوث عمليتي التلقيح و الاخصاب والتي هي عبارة عن اتحاد الجاميطات المذكرة Sperms والناتجة عن إنبات حبوب اللقاح بالجاميطات المؤنثة أو البويضات Eggs الموجودة في مبيض الزهرة .وحيث أن البويضات توجد دائماً داخل المبيض لذلك يجب أن تنتقل إليها الجاميطات المذكرة وتسمى عملية الانتقال هذه بعملية التلقيح،

أما عملية الاخصاب فتبدئ عندما تصل الأنبوبة اللقاحية إلى نسيج البويضة وتدخل الأنبوبة اللقاحية إلى فجوة المبيض حاملة الجاميطة المذكرة التي تندمج أو تتحد مع الجاميطة المؤنثة وعملية الاندماج هذه تعرف بالاخصاب والتي بواسطتها يتكون الجنين ومن ذلك نرى أنه توجد مدة من الزمن من ابتداء انبات حبة اللقاح واختراقها نسيج الميسم حتى عملية الاخصاب وهذه المدة تختلف طويلاً في النباتات تبعاً لسرعة سير الأنبوبة اللقاحية أو بطئها فقد تبلغ يومين أو ثلاثة أيام أو أكثر في عدد كبير من النباتات وقد تمتد هذه المدة فتبلغ 11 شهراً كما في بعض أنواع البلوط أو تصل إلى سنتين كما في الصنوبر.

وعادة يتم التلقيح أو انتقال حبوب اللقاح إلى مياسم الكرابل بالملامسة وذلك عندما تكون المتوك والمياسم متجاورة الوضع وتنضج في وقت واحد أو بالجاذبية وذلك في حالة إرتفاع متوك الأسدية عن المياسم وقد يحدث التلقيح بفعل الرياح أو الحشرات أو المياه أو الطيور أو الإنسان

طبــــــــــــــــقات الثمرة

(1) الطبقة الخارجية Exocarp

(2) الطبقة الوسطى Meso carp

(3) الطبقة الداخلية Endocarp

تصنيف الثمار : تقسم الثمار استنادا للاسس التصنيفية التالية

- 1- تركيب الزهرة التي تكونت منها الثمرة.
- 2- عدد المبايض التي تشترك في تكوين الثمرة.
- 3- عدد الكرابل في كل مبيض.
- 4- طبيعة جدار الثمرة الناضجة.
- 5- تفتح الثمرة الجافة او عدم تفتحها وشكل التفتح.
- 6- الاجزاء الزهرية الاضافية التي قد تشترك في تكوينها، وبناءا على هذه الاسس تقسم الثمار تبعاً لأصلها الزهري إلى ثلاث مجموعات: 1 - الثمار البسيطة 2 - الثمار المركبة 3 - الثمار المتجمعة

### اولاً" الثمار البسيطة simple fruit

تنشأ من نضوج مبيض واحد بغض النظر عن عدد الكرابل ، وتقسم بالنسبة لطبيعة الجدار

#### أ- الثمار الطرية simple succulent fruits

جدارها لحمي عصيري يحتوي نسبة عالية من الماء والسكريات، تتميز فيها الطبقات الثلاث الخارجية والوسطى والداخلية ولا يشترط ان تكون طرية وقد تكون ملتحنة و منمجة وتحتوي على بذرة واحدة او اكثر وتقسم الثمار الطرية الى :

- (1) لبية Berry : غلافها طري لحمي تتميز فيه الطبقات الثلاث الخارجية في الغالب غشائية او جلدية كما في التمر والطماطة
- (2) لوزية Drupe تشبه اللبية الا ان الطبقة الداخلية صلبة صخرية وتحتوي على بذرة واحدة كالمشمش.



4) **برتقالية Hesperidium** تنشأ الثمرة من مبيض مرتفع عديد الغرف تنتشر في الطبقة الخارجية الغدد الزيتية والطبقة الوسطى نسيج ليفي ابيض والداخلية غشاء رقيق يحيط بالغرف . وان الجزء المأكول هو شعيرات عديدة الخلايا تعرف بالاكياس العصارية pulp sacs تنشأ كنموات من الطبقة الداخلية ومن امثلتها البرتقال والليمون .

ب- ثمار بسيطة جافة Simple dry fruits

(1) **جافة منفتحة dry dehident** : ثمار عديدة البذور ينفث جدارها بعد النضوج ويعتمد أسلوب التفتح على تشريح الثمرة ، بعض النباتات تبقى الثمرة مغلقة كما في بعض انواع اليوكالبتوس ( هذا يعرف بالسبات)، تصنف الثمار الجافة المنفتحة الى:

ب- البقلة legume : تتكون من كربة واحدة وتترتب البويضات على مشيمة حافية وتفتح على امتداد التدرزين البطنى والظهري ويبقى الاتصال مع القاعدة فقط تنفرد العائلة البقالية بهذا النوع من الثمار.

**ج- الخردلة Sillque** : مبيض ثنائي الكرابل جداري التمشيم الا انه يحتوي غرفتين بسبب الحاجز الكاذب replum يمتد بين المشيمتين وتستقر البذور على الحاجز، هذه الثمرة من مميزات العائلة الصليبية Brassicaeae غالبا ما تكون طويلة ورفيعه.

د- العبلة: capsule تتشأ من مبيض مركب ذي غرف متعددة وتنتفح باحد الطرق الاتية :

1- **تفتح بالاسنان by teeth** حيث ينشق القسم العلوي من جدار الثمرة الى فصوص تشبه الاسنان كما في القرنفل *Dianthus sp*

2- **تفتّح** بالثقب **pores** تكون ثقب على شكل حلقة في قمه الثمرة كما في الخشخاش **Papaver**  
 3- **تفتّح** مستعرض **circumscissile** تنفتح العلبة على امتداد خط افقي يحيط بالثمرة على شكل غطاء كما

Primula في زهرة الربيع

4- **تفتح مصراعي valvular** يفصل جدار الثمرة عموديا" الى قطع بعدد الكرابل وتسمى المصاريح ويتم ذلك بـ3 طرق هي:

(أ) **تفتح مسكني loculicidal** يحدث التشقق على امتداد التدريز الظهري حيث تؤدي الشقوق الى الغرف والبذور مباشرة كما في القطن *Gossypium*

(ب) **تفتح حاجزي septicidal** تنشق الثمرة على امتداد حافات الكرابل مقابل الحواجز فيظهر للمصراع حاجز من كل جانب كما في الكتان

**ج) فتفتح ( حاجزي – مسكني) septifragal** يحدث التشقق على امتداد التدريز الظهري وامتداد حافاتها فتتفصل الجدران تاركة الحواجز متصله بالمحور الوسطي كما في الداتورة.

(2) **جافه غيرمتفتحة dry indehidcent**: تبقى البذور داخل الثمار ويتم تحررها بعد النضوج نتيجة لتحلل جدارها بفعل العوامل البيئية وهي عادة وحيدة البذرة وتصنف الى:

أ- **فقيرة Achene** ثمرة صغيرة وحيدة البذرة مشتقة من مبيض مرتفع وحيد الكربة جدارها غشائي او

جلدي رقيق غير ملتحم وهي من خصائص عائلة المركبة Asteraceae

ب- **الحبة ( البرة ) grain** تشبه الفقيره لكن الغلاف الخارجي يلتحم مع غلاف البذرة التحاما " تاما " بحيث يصعب الفصل وتعتبر هذه الثمرة من صفات العائلة النجيلية Poaceae

ج- **المجنحة Samara** تشبه الفقيره لذا يسميها البعض الفقيرة المجنحة تتميز بوجود تركيب غشائي يمتد من الجدار على شكل جناح وقد يكون عريض دائري يحيط بالثمرة من كل جوانبها كما في الدردار ، اما الاسفندان فيكون ثنائي الاجنحة لوجود كرتلتين

د- **البندق Nut** كبيرة الحجم نسبيا لها جدار صلب خشبي تنشأ من مبيض مركب ذو غرفة واحدة كما في البندق والكستناء ، وللبندق احيانا تركيب فنجاني يتكون من التحام البندقات nutlet يعرف بالقمع cupule

كما في البلوط Quercus  
هـ **المثانية Uricle** صغيرة وحيدة البذرة جدارها غشائي منتفخ لامتلأه بالهواء كما في بعض انواع العائلة السعدية.

(3) **جافه منشقة Schizocarps** : تتكون الثمرة من اكثر من كربة وبعد نضوجها تنفصل الى عدد من وحدات ثمرية وحيدة غير متفتحة تعرف بـ mericarps وهي توجد باحد الاشكال الاتية :

أ- **متخصرة Loment** ثمرة بقلية تتخسر بين البذور وبعد النضج تنتشر عرضيا كما في فستق العبيد

ب- **خيمية Cremocarp** تنشأ من مبيض منخفض من كرتلتين تنتشر الثمرة بعد النضوج الى نصفين ويبقى كل منهما متصلا بالقمة بخيط رفيع يعرف بالحامل الكربلي carpophore الذي في اعلاه تضخم قرصي الشكل هو قاعدة القلم stylopodium وتوجد هذه الثمرة في العائلة المظلية Apiaceae

ج- **خبازية Carcerulus** تنشأ من مبيض عديد الكرابل محوري التمشيم تنتشر الثمرة بعد النضج الى عدد من mericarps = عدد الغرف وفي كل منها بذرة جنس الختمه للعائلة الخبازية Malvaceae

د- **الركما Regma** تنشق الثمرة بعد نضوجها الى عدد من القطع = عدد الكرابل وتبقى معلقة بواسطه حوامل كربة حول محور وسطي طويل torus وهو امتداد للثخت كما في الجيرانيوم والخروع

### ثانياً : الثمار المتجمعة Aggregate fruits

تنشأ من زهرة واحدة لها كرابل عديدة سائبة apocarpous ينضج كل منها ثميرة fruitlet وتحمل الثميرات على تخت مشترك ، تختلف الثمار المتجمعة تبعا لنوع الثميرات فقد تكون فقيرة وحينها تسمى aggregate of achenes كما في الفراوله ( الشليك ) ويكون تخته عصاريا والورد الاشرفي وقد تكون حويصلة او لوزية كما في توت العليق للعائلة الوردية

### ثالثاً : الثمار المتضاعفة ( المركبة ) Multiple ( composite) fruits

تنضج النورة تتحول كل زهرة فيها الى ثميرة وتنضج الثميرات لتسقط كثمرة واحدة تسمى في التوت sorosis كل ثميرة بنيدقة مع 4 اوراق كاسية عصارية ( تعطي الطعم ) ، اما التين Ficus فتعرف بـ syconium وتنشأ من نورة خاصه بنفس الاسم القسم المأكول هو تخت مع الحامل حيث يتضخم كل منهما ليتحول الى تركيب لحمي عصاري حلو المذاق وتقع الثميرات على السطح الداخلي للثخت المجوف وبعض اصناف التين عذرية.

## النباتات البذرية (Spermatophytes (SEED PLANTS) (Gr. Sperma=seed+phyton=plant)

تعتبر النباتات البذرية (وهي تلك النباتات التي تتكاثر بواسطة البذور) من ارقى النباتات التي تسود سطح الكرة الارضية في الوقت الحاضر واكثرها تعقيداً من الناحية التركيبية ويزيد عدد الانواع التابعة لها على 300000 نوعاً وتشمل النباتات البذرية صنفين هما:

**صنف عاريات البذور Class Gymnospermae**

**صنف مغطاة البذور Class Angiospermae**

ويسمى الصنف الاخير بالنباتات الزهرية *Flowering plants* وتمتاز النباتات البذرية بما يلي:

- I. تكون بذور كنتاج للتلقيح الجنسي وتعد هذه الخطوة من الخطوات التطورية المهمة التي تميز هذه المجموعة عن مجاميع النباتات الاخرى.
- II. تعقد الطور اليوغي (السيورفايتي) *sporophyte* واختزال الطور الكميوتوفايتي او المشيجي *gametophyte* حيث يتمثل الطور الاخير بحبوب اللقاح والكيس الجنيني حيث تمثل حبوب اللقاح *pollen grains* الكميوتوفايت الذكري بينما يمثل الكيس الجنيني *Embryo Sac* الكميوتوفايت الانثوي، ويمتاز الطور الكميوتوفايتي اعتماده كلياً في تغذيته على طور السيورفايت.
- III. عدم الحاجة الى الماء لاتمام عملية الاخصاب اذ ان المشيج الذكري (حبة اللقاح) تنتقل بوسائل عديدة منها الرياح والحشرات والتدبيبات والمياه في حين ان وجود الماء ضروري لاتمام عملية الاخصاب بعد خطوة تطويرية هامة ساعدة على التكيف للمعيشة على اليابسة.
- IV. تعقد جيل السيورفايت حيث تتكون الجذور والسيقان والاوراق ويتراوح حجم السيورفايت بحجم راس الدبوس كما في عدس المي *Lemna* الى نباتات عملاقة يصل ارتفاعها الى اكثر من مائة متر.
- V. تمتاز البذريات بكونها متباينة السيورات *heterospores* اي سيورات صغيرة *microspores* وسيورات كبيرة *Megaspores* وهذه تنمو الى نباتات مشيجية ذكرية وانثوية (المقصود هنا بالسيورات حبوب اللقاح او البويضة). تقسم النباتات البذرية الى مجموعتين كبيرتين هما:

**1- صنف (صف) عاريات البذور Gymnospermae**

**2- صنف (صف) كاسيات البذور Angiospermae**

**1- صنف (صف) عاريات البذور Class Gymnospermae**

تعد عاريات البذور الحية بقايا الماضي، حيث يعتقد ان اول ظهور لها كان في اواخر العصر الكربوني *Carboniferous period* وكانت لها السيادة على جميع النباتات الارضية خلال معظم الدهر الوسيط *Mesozoic* (قبل 230-55) مليون سنة الا انه لم يبق منها حالياً الا حوالي 726 نوعاً مقارنة باكثر من 300000 نوعاً من النباتات الزهرية، ويعتقد بان السرخسيات البذرية *seed fern* تعد اوطأ هذه النباتات في السلم التطوري. وسميت بعارية البذور لكون البويضات فيها والبذور الناتجة عنها لا تحمل داخل تركيب مغلق (المبيض او الثمرة) كما هو الحال في مغطاة البذور، لذا فان البذور تكون محمولة على سطوح تراكيب حشفية منبسطة شبيه بالاوراق تسمى حراشف بويضية *ovuliferous* (= حراشف حاملة للبويضات) ومن هنا جاءت الكلمة الاغريقية *Gymnospermae* والتي تعني عارية البذور. تضم معراة البذور سبعة رتب ثلاثة منها منقرضة واربعة منها باقية وهي:

رتبة السايكادات Order Cycadales

رتبة المخروطيات Order conifrenles

## رتبة الجنكوالات Order Ginkgoales

### رتبة النيتلات Order Gnetales

يوجد في العراق منها رتبتان هما Order Gentales و Order conifrenlis وتتمثل الاولى بعائلة واحدة هي العائلة *Family Ephedraceae* والرتبة الثانية تتمثل بالعائلة *Pinaceae* وهي عائلة الصنوبر وعائلة السرو *Supressaceae* وتحتوي على ثلاثة اجناس هي العرعر *Juniperus* والسرو *Cupressus* والعفص *Thuja*. اما الرتبة الاولى فيوجد منها في العراق نباتات دخيلة وتتمثل بالسايكادات.

### وتمتاز عاريات البذور:

- (1) اعضائها التكاثري مرتبة بشكل مخاريط strobilus (pl.strobili) وهي على نوعين ذكرية تحمل حبوب اللقاح microspore واثوية تحمل البويضات Megaspores.
- (2) تنتقل حبوب اللقاح بواسطة الرياح الى البويضات ويحتوي انبوب اللقاح على نواتين ذكريتين تتحد احدهما مع البيضة والثانية تنحل اي لا يوجد اخصاب مزدوج ويحاط الجنين بنسيج السويداء (femalegametophyte) ويحتوي الجنين على 1-17 فلقة.
- (3) تتكاثر بالبذور ونادرا تتكاثر خضرياً في حين ان التكاثر الخضري مألوف في مغطاة البذور.
- (4) العناصر الناقلة هي القصيبات في ماعدا العلنديات Ephedraceae او النيتلات Gnetales التي تحتوي على اوعية وقصيبات اما اللحاء فلا توجد خلايا مرافقة فيه ولا اوعية او انابيب منخلية بل توجد خلايا منخلية فيما عدا رتبة النيتلات.
- (5) جذورها وتدية قوية والساق يحتوي على لب الا ان الجذور خالية منه.
- (6) الثمار اما على شكل مخاريط مكونة من حراشف سميكة كما في المخروطيات Coniferales او حراشف رقيقة كما في السرو والذي يعود الى العائلة Cupressaceae.
- (7) نباتاتها معمرة دائمة الخضرة عادة ماعدا الجنكو *Ginkgo* (يطلق عليه بالمتحجر الحي) وبعض المخروطيات الاخرى.
- (8) اوراقها ابرية او حرشفية صغيرة او كبيرة طولها 2 ملم- 20 سم، اما الجنكو فهو يحتوي على اوراق بسيطة مروحية مقروضة القمة، اما الـ Cycads فاوراقها شبه سعفية يصل طولها الى 2 م او اكثر.

## صنف مغطاة البذور Class Angiospermae

تعرف هذه النباتات بالنباتات الزهرية وهي اكثر النباتات تطوراً وتعد الزهرة من اهم العوامل التي ساهمت في سرعة تطور وتنوع النباتات الزهرية، فتطور الزهرة ضمن حدوث التلقيح الخلطي crosspollination والذي زاد من التغيرات الوراثية حيث ادى الى ظهور تشكيلات وراثية (جينية) واسعة ساعدت على انتشار النباتات الزهرية وتكيفها لبيئات مختلفة وقد رافق تطور النباتات تطور الملقحات كالحشرات والطيور والثدييات وهناك اراء حول نشوء هذه النباتات اي في حالة كونها Monophyletic اي ذات اصل واحد او متعددة الاصول polyphyletic. وتضم مغطاة البذور اكثر من 300000 نوعا تقع في حوالي 300 عائلة نباتية.

## مميزات مغطاة البذور

- (1) جميعها تحمل ازهارا تحمل حبوب لقاح وامشاج انثوية.
  - (2) وجود البويضات والبذور داخل تركيب مغلق هو المبيض والذي يتحول بعد نضجه الى ثمرة في حين تكون البذور في عاريات البذور مكشوفة على سطوح كرابل مفتوحة لذا فان انبوب اللقاح ينمو داخل القلم في مغطاة البذور حتى يصل الى الكيس الجنيني (هناك ثلاث حالات نادرة جدا لنباتات زهرية تكون فيها الكرابل مفتوحة جزئياً والبويضات غير محاطة كلياً بجدار المبيض كما في الجنسين *Reseda* (ذيل الخروف) والاسفندان *platanus*
  - (3) يحتوي الخشب على اوعية وقصيبيات ولو ان الصبيرييات *Cacti* تفقد اوعيتها نتيجة للتخصص كما ان بعض العائلات لا تحتوي على اوعية كالعائلة *Winteraceae*.
  - (4) يحدث اخصاب مزدوج *double fertilization* (ينتج عنه جنين وسويداء).
  - (5) يتم التلقيح بوسائل مختلفة كالرياح والحشرات والطيور واللبائن والمياه وغيرها، بينما نجد في عاريات البذور يقتصر على الرياح.
  - (6) معظمها نباتات عشبية الا انها قد تكون خشبية
- تقسم النباتات الزهرية الى صنفين ثانويين استنادا الى عدد الفلق

### 1- Subclass Monocotyledonae

### 2- Subclass Dicotyledonae

- هناك حالات شاذة في الرتبة *Proteales* من ذوات الفلقتين فيها انواع ذات عدد من الفلق يتراوح بين 3-8 فلق، بينما نجد العائلة *Balanophoraceae* لا تحتوي نباتاتها على فلق، كما ان الفلق تكون معدومة في بعض انواع ذوات الفلقة الواحدة كما في الـ *Orchids*.

## نقاط التشابه بين مغطاة وعاريات البذور



- 1- الطور المشيجي مختزل ويعتمد على الطور السبوري
- 2- السبوريات متباينة *heterospory*
- 3- تحتوي على انابيب لقاح وبذور وجذور وسيقان واوراق حقيقية.

## وفيما يلي مقارنة بين ذوات الفلقة وذوات الفلقتين

| Monocotyledons                                                                                   | Dicotyledons                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1- يحتوي الجنين على فلقة والانبات ارضي عادة                                                      | 1- تحتوي على زوج من الفلق والسويداء اما موجودة او غير موجودة، الانبات هوائي عادة |
| 2- الجذر الاولي قصير العمر وسرعان ما يبدل بالجذور العرضية والجذر الوتدي لا يوجد                  | 2- الجذر وتدي والجذر الاولي موجود                                                |
| 3- عادة عشبية والقليل منها اشجار كالنخيل                                                         | 3- اما ان تكون عشبية او خشبية                                                    |
| 4- الحزم الوعائية كثيرة ومبعثرة ومغلقة عادة اي خالية من الكميوم، وقد تنتظم بحلقتين كما في الحنطة | 4- الحزم الوعائية ذات عدد محدود ومنظمة في حلقة فتكون مفتوحة اي حاوية على كامبيوم |
| 5- التعرق متوازي والغالبية ذات غمد <i>sheath</i>                                                 | 5- الاوراق ذات تصرف شبكي والغمد <i>sheath</i> نادر                               |
| 6- الحلقات الزهرية تكون اوراقها ثلاثة او مضاعفات اي 3- merous                                    | 6- الاوراق الزهرية توجد 4-5 في الحلقة الواحدة 5-4 merous                         |

## البذور

البذرة هي بويضة مخصبة تكونت من مبيض الزهرة، وهي أساس التكاثر في النباتات الراقية وتبدأ منها حياة جيل جديد. ويمكن تعريف البذرة على أنها نبات جنيني صغير في حالة السكون، وتتكون البذرة من الجنين الذي يحاط بغلاف يسمى القصرة testa، غالباً صلب سميك وتحت الشغاف tegmen ومن كمية من الغذاء المدخر إما أن يكون مختزن في بعض أجزاء الجنين، أو منفصلاً عنه في نسيج خاص يسمى سويداء البذرة endosperm وتوصف البذرة في الحالة الأولى بأنها non endosperm، وفي الحالة الثانية بأنها إندوسبيرمية. وفي البذرة اللاندوسبيرمية يتم اختزان المواد الغذائية غالباً في الفلقتين cotyledons التي تبداً ممتلئتين ضخمتين متشحمتين. وقد يخزن الغذاء في نسيج البريسبريم perisperm وهو من بقايا الجوزاء nucellus التي تحيط بالكيس الجنيني كما في الهيل . بذرة avocado تظهر الغطاء المزدوج للجنين والجنين الداخلي أما الجنين فيتتركب من نفس الأعضاء الأساسية التي يتركب منها النبات البالغ، وهي الجذر والساق والأوراق، ولكن في صورة مصغرة غاية التصغير، فيسمى الجذر الجنيني بالجير radicle، والساق الجنينية فوق فلقية epicotyl تقع فوق نقطه اتصال الفلق بالمحور الجنيني ومنها تكون الساق والأوراق ومن جزء آخر تحت فلقى hypocotyl منطقة انتقالية بين ارتباط الفلق بالمحور الجنبني والجذر. ومن المعالم الخارجية للبذرة السرة hilum وهي ندبة على الغلاف تمثل مكان اتصال الحبل السري funiculus بالبذرة والرفاية raphe هي حافة تمثل بقايا الحبل السري وتبين موقع التحامه بغلاف البذرة والكلازا chalaza هي المنطقة العليا من الرفاية حيث ينتشر الحبل السري ويندمج مع قاعدة البويض ، يتواجد في العائلة السوسبية caruncle السباسة : وهو نمو من الغلاف الخارجي يخفي تحته السرة والنقير micropyle ( فتحة ضيقة قرب السرة ) يفيد في المتصاص الماء الذي ي يحتاجه الجنين عند الانبات ويسهل مروره عبر النقير . ويختلف عدد الفلقات في النباتات مغطاة البذور فتتكون البذرة في أحاديات الفلقة من بذرة واحدة ومثال ذلك بذور القمح والذرة الشعير النخيل، وتتكون البذرة من فلقتين في ثنائيات الفلقة مثل الفول العدس والفاصولياء الخروع القطن ومعظم الأنواع الشجرية.



هنالك قيمة تصنيفية مهمة للتغيرات التي تلاحظ في غلاف البذرة كاحتوائها على تجعدات أو نقر أو شعيرات وتسمى بالزر كشة السطحيه surface configuration وهي على عدة انواع منها :

- 1- Muricate سطح خشن بسبب بروزات دقيقه جدا كما في الباميا
- 2- Alveolate منقر السطح على هيئة خلايا نحل كما في البتونيا
- 3- Reticulate للنتوءات مظهر شبكي كما في الفجل
- 4- Striped مخطط طولي رفيع متبادل مع اخادير كما في المارتينيا
- 5- Hairy مغطى بشعيرات كما في القطن
- 6- Comose على الغلاف خصلة واحدة كما في الصفصاف
- 7- Winged تمتد من القصرة زوائد غشائية على هيئة جناح كما في الصنوبر
- 8- Arillate من الغلاف زائدة لحمية وقد تحيط به احاطة تامة كما في بعض انواع عائلة الدفلة

## العوائل النبّاتية

هنالك نمط خاص عند وصف العوائل النباتية ويكون بشكل تسلسل كما يلي :

- 1- تذكر طبيعة النبات، اعشاب او معمرة
- 2- الاوراق اذا كانت بسيطة او مركبة ، متبادلة او متقابلة
- 3- الازهار
  - (a) ثنائي الجنس او احادي الجنس ، التناظر
  - (b) الكأس منفصل او ملتحم ، عدد الاوراق الكأسية
  - (c) التويج منفصل او ملتحم ، عدد الاوراق التويجية
  - (d) الجهاز الذكري ( العدد، الاتحاد، عدد الخويطات، تفتح المتوك)
  - (e) الجهاز الانثوي ( عدد الكرابل ، التمشيم ، القلم)
  - (f) النورة
  - (g) الثمرة
  - (h) الاهمية الاقتصادية
  - (i) الصفات المميزة

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

## الصفات المميزة لبعض العوائل النباتية

+ العوائل ذوات الفلقة الواحدة

### 1- العائلة النجيلية ( عائلة الحشائش ) Poaceae

### الصفات المميزة :

1. الاوراق غمدية
  2. الساق مجوف وعليه عقد متضخمة
  3. النورة سنبلية مركبة
  4. الثمرة حبة
- الامثلة : حنطة ، شعير ، رز

2-العائلة النخيلية palmae

الصفات المميزة :

1. ساق منتصب غير متفرع
2. اوراق كبير تقع في قمة الشجرة
3. النورة اغريضية غالبا

### الامثلة : النخيل

### 3- العائلة الزنبقية Liliaceae

### الصفات المميزة :

1. الاوراق جذرية او ساقية
2. الغلاف الزهري تويجي زاهي الالوان
3. المبيض مرتفع ، ثلاث مياسم ، 6 اسدية
4. النورة تحمل على ساق زهرى

الامثلة : بصل ، كرات ، ثوم

#### 4- العائلة النرجسية Amaryllidaceae

الصفات المميزة :

1. 6 اسدية مرتكزة على البتلات
2. الغلاف الزهري من 6 قطع غير متميز الى كأس وتويج
3. المبيض منخفض، 3 غرف ، ثلاث مياسم ، قلم واحد

الامثلة : النرجس

+ العوئل ذوات الفلقتين

#### 5- العائلة الصليبية Brassicaceae

الصفات المميزة :

1. اربع اوراق تويجي متصالبة مخلبية و 4 اوراق كاسية ( اسم العائلة اشتق منها)
2. الجهاز الذكري من 6 اسدية ، طويلة الاربع
3. 2 ميسم ، قلم واحد او معدوم
4. وجود حاجز كاذب في المبيض
5. الثمرة خردلة او خريدلة

الامثلة : اللهانة، قرنابيط ، فجل ، شلغم

#### 6- العائلة البقلية Fabaceae

الصفات المميزة :

1. اوراق مركبة ريشية عادة
2. اسدية كثيرة ثنائية الحزم
3. تناظر شعاعي او جانبي فراشي
4. المشيمة دوما جدارية
5. الثمرة بقلة

الامثلة : باقلاء، فاصوليا، فول سوداني، حلبة

#### 7- العائلة الباذنجانية Solanaceae

الصفات المميزة :

1. حزم وعائية ثنائية اللحاء
2. الازهار شعاعية التناظر
3. كأس دائمي
4. المبيض بغرقتين ومشيمة مركزية متشحمة واسعة
5. البذور عديدة

الامثلة : باذنجان ، طماطه ، فلفل، بتونيا، بطاطا



## 8- العائلة القرعية Cucurbitaceae

الصفات المميزة :

1. وجود المحاليق ، النبات زاحف او متسلق
2. الساق خماسي الزوايا
3. الاسدية ملتحمة
4. المبيض منخفض والمشاييم جدارية
5. ازهار احادية الجنس
6. الثمرة قشائية

الامثلة : خيار، رقي ، شجر

## 9- العائلة المظلية Apiaceae

الصفات المميزة :

1. رائحة عطرية مميزة
2. عنق الورقة غمدي
3. نورة مظلية
4. المبيض منخفض من كربلتين وغرفتين
5. الثمرة منشقة

الامثلة : جزر، كرفس، شبنط، كزبرة

## 10- العائلة الخبازية Malvaceae

الصفات المميزة :

1. اسدية متحدة الخويطات بحزمة واحدة monadelphus
2. المتك من فص واحد احادي الغرف
3. حبوب اللقاح كبيرة وشائكة
4. وجود الظرف الزهري Epicalyx
5. اوراق التويج متراكبة وملتفة
6. شعيرات نجمية على الاوراق
7. عصير لزج
8. الثمرة علبة تفتحها مسكني او منشقة

الامثلة : قطن، باميا، ورد الختمة، خباز

## 11- العائلة المركبة Asteraceae

الصفات المميزة :

1. نورة رأسية محاطة بظرف قنابي
2. وجود ازهار قرصية او شعاعية او كليهما
3. 5 متوك متحدة
4. مبيض منخفض ، كربلتين ، غرفه واحدة بويض واحد
5. قلم واحد وميسمين

6. كأس مختزل

7. ثمرة فقيرة

الامثلة : عباد الشمس ، خس ، جعفري ، المازا

## 12- العائلة السذبية ( عائلة الحمضيات) Rutaceae

الصفات المميزة :

1. الاوراق منقطعة بغدد زيتية تنفرد بها العائلة
2. المبيض منخفض جالس على قرص غدي
3. الاسدية الخارجية تقابل البتلات
4. الاوراق مركبة وجرداء

الامثلة : البرتقال، الليمون ، السندي

## 13- العائلة الوردية Rosaceae

الصفات المميزة :

1. الزهرة محيطية خماسية الاجزاء
2. المبيض مرتفع او منخفض
3. وجود الاذينات عادة
4. وجود الانبوب التختي في معظم الاجناس
5. اسدية كثيرة
6. اوراق بسيطة او مركبة ريشية

الامثلة : تفاح ، عرموط، لوز، مشمش ، الورد ، الفراولة

## 14- العائلة الشفوية Lamiaceae

الصفات المميزة :

1. الزهرة جانبية التناظر
2. مبيض باربعة فصوص في كل منها بويض واحد
3. قلم قاعدي ينتهي بفرعين
4. اربع اسدية ( او اثنتان فقط)
5. مقطع الساق مربع والاوراق متقابلة
6. وجود زيوت عطرية

الامثلة : ريحان ، زعتر، نعناع

## 15- العائلة التوتية Moraceae

الصفات المميزة :

1. وجود عصير حليبي
2. النورة هرية
3. الغلاف الزهري من 4 سبلات
4. الازهار احادية الجنس

5. الاسدية 4 متقابلة للسبلات
6. مبيض بغرفة وبويض مغلق

الامثلة : التوت

#### 16- العائلة القرنفلية Caryophyllaceae الصفات المميزة :

1. اوراق متقابلة وقواعد غمدية
2. عقد الساق منتفخة
3. تميشم مركزي
4. الثمرة علبة تفتح باسنان

الامثلة : القرنفل

#### 17- العائلة الخشخاشية Papaveraceae الصفات المميزة :

1. اوراق كأسية نفضية
2. البتلات مجعدة داخل البرعم
3. الاسدية غير محدودة
4. التمشم جداري
5. الثمرة علبة والتفتح بثقوب
6. وجود عصير حليبي

الامثلة : الخشخاش

#### 18- عائلة المينا Verbenaceae الصفات المميزة :

1. الساق رباعي الاضلاع
2. الاوراق متقابلة
3. الازهار جانبية التناظر
4. اسدية 4 (2+2) مرتكزة على التويج
5. القلم ناشي من قمة المبيض

الامثلة : المينا